

“助力乡村学校音体美课堂行动”官方合作图书
V 研客及全国各大考研培训学校指定用书

2022

金榜时代考研数学系列

数学基础过关 660题 习题册 (数学一)

编著◎李永乐 王式安 刘喜波 宋浩 姜晓千 铁军 武忠祥 章纪民 李正元 蔡燧林 胡金德

主编建议 | 与《数学复习全书·基础篇》、《历年真题全精解析·基础篇》配合使用 ● 无基础 不数学!

通关攻略 | 赠送《通关攻略》，内含复习指导，量化题与知识点，记录练习成果，统计薄弱考点 ● 二刷三刷必备攻略

刷题绝配 | 微信扫右侧二维码即可免费观看全部重点题、难题超精讲视频



金榜时代考研数学名师团队



线代王·李永乐 @清华李永乐考研数学辅导团队

微信公众号: 永乐讲线代
B站: 李永乐考研团队

- 原清华大学应用数学系教授
- 北京高教学会数学研究会副理事长
- 广受学生信赖的“线代王”
- 全国硕士研究生入学考试北京地区数学阅卷组组长
- 百万畅销书《线性代数辅导讲义》《考研数学复习全书》主编

李老师作为全国著名的考研数学线性代数辅导专家,对考研数学出题形式、考试重点了如指掌,解题思路极其灵活,辅导针对性极强,效果优良,成绩显著,受到广大学员的交口称赞。其主编的《线性代数辅导讲义》《数学复习全书》《数学基础过关660题》等已被历届考生公认为复习首选辅导书。



前命题组组长·王式安 @清华李永乐考研数学辅导团队 B站: 李永乐考研团队

- 原北京理工大学研究生院院长、应用数学系主任、教授
- 享受国务院特殊津贴的数学专家
- 美国哥伦比亚、南佛罗里达、纽约等大学的客座教授
- 1987-2001年间担任全国硕士研究生入学考试数学命题组组长
- 百万畅销书《概率论与数理统计辅导讲义》《考研数学复习全书》主编

王老师凭借多年参加考研数学命题工作的深厚经验,对考研数学的命题思路和命题方向了如指掌。其主编的《概率论与数理统计辅导讲义》《数学复习全书》《数学基础过关660题》等已被历届考生公认为复习首选辅导书。



考研数学阅卷人·宋浩 @宋浩老师 B站: 宋浩老师官方

- 山东大学数学学院本科研究生、中国科学院博士
- 英国 Queen Mary University of London 访问学者
- 副教授, 考研数学阅卷人

宋老师上课风趣幽默、由浅入深,能把复杂抽象的数学讲的诙谐有趣,上传至B站的数学视频《线性代数》、《微积分》、《概率论与数理统计》、《高等数学》帮助了全国无数的大学生,总播放量近2000万次。宋老师讲考研数学,延续风趣幽默的特点,喜欢从多种角度找寻思路,善于总结知识点,把晦涩难懂的考研知识讲的生动而有趣。



高数王者·姜晓千 @晓千老师 微信公众号: 晓千老师

- 中国人民大学金融数学博士
- 全国各大省市考研辅导机构全程主讲
- 新浪、搜狐、腾讯、网易、中国教育在线等各大门户网站特邀访谈嘉宾

姜老师对考研数学历年真题有着极其深入的研究,授课风格高屋建瓴、激情洋溢、亲和幽默,深受考研学子喜爱。



刘喜波 @清华李永乐考研数学辅导团队

- 中国科学院数学博士
- 北方工业大学理学院统计学系系主任、教授

长期从事本科生的教育教学工作,曾荣获学校师德先进个人、十佳班导师等称号,是北京市中青年骨干教师、北京市公共数学优秀教学团队主要成员,主编教材1部、教学参考书3部、教育教学论文集1部、译著2部,参编教学参考书10余部。



武忠祥 @清华李永乐考研数学辅导团队

原西安交通大学(985、211双一流高校)数学系教授
美国爱荷华大学(2019美国综合性大学TOP100)访问学者
百万畅销书《高等数学辅导讲义》《考研数学复习全书》主编
高教社《工科数学分析基础》《高等数学基础》等教材主编

“助力乡村学校音体美课堂行动”官方合作图书

V 研客及全国考研培训学校指定用书

金榜时代TM
GLIST 明德·弘毅·品质 02

金榜时代考研数学系列

数学基础过关

660题 习题册
(数学一)

2022

编著◎李永乐 王式安 刘喜波 宋浩 姜晓千 铁军 武忠祥 章纪民 李正元 蔡燧林 胡金德

微信公众号:顶尖考研
(ID:djky66)

@考研路上刚刚启程的你

业精于勤，荒于嬉；行成于思，毁于随。

中国农业出版社
CHINA AGRICULTURE PRESS

·北京·

图书在版编目(CIP)数据

数学基础过关 660 题·数学一 / 李永乐等编著.
—北京:中国农业出版社,2020.8
ISBN 978-7-109-27183-8

I. ①数… II. ①李… III. ①高等数学—研究生—入
学考试—习题集 IV. ①O13-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2020)第 145752 号

微信公众号【顶尖考研】
(ID: djky66)

中国农业出版社出版

地址:北京市朝阳区麦子店街18号

邮编:100125

责任编辑:吕睿

责任校对:吴丽婷

印刷:河北鑫柠印刷有限责任公司

版次:2020年8月第1版

印次:2020年8月北京第1次印刷

发行:新华书店北京发行所

开本:787mm×1092mm 1/16

印张:30

字数:480千字

定价:99.80元

版权所有·侵权必究

凡购买本社图书,如有印装质量问题,我社负责调换。

服务电话:010-59195115 010-59194918

内容简介及使用说明

考研数学满分 150 分,数学在考研成绩中的比重很大;同时又因数学学科本身的特点,考生的数学成绩历年来千差万别,数学成绩好在考研中很占优势,因此有“得数学者考研成”之说。既然数学对考研成绩如此重要,那么就有必要探讨一下影响数学成绩的主要因素。

本系列图书作者根据多年的命题经验和阅卷经验,发现考研数学命题的灵活性非常大,不仅表现在一个知识点与多个知识点的考查难度不同,更表现在对多个知识的综合考查上,这些题目在表达上多一个字或多一句话,难度都会变得截然不同。正是这些综合型题目拉开了考试成绩的距离,而构成这些难点的主要因素,实际上是最基础的基本概念、定理和公式的综合。同时,从阅卷反映的情况来看,考生答错题目的主要原因也是对基本概念、定理和公式记忆和掌握得不够熟练。总结为一句话,那就是:要想数学拿高分,就必须熟练掌握、灵活运用基本概念、定理和公式。

基于此,李永乐考研数学辅导团队结合多年来考研辅导和研究的经验,精心编写了本系列图书,目的在于帮助考生有计划、有步骤地完成数学复习,从基本概念、定理和公式的记忆,到对其的熟练运用,循序渐进。以下介绍本系列图书的主要特点和使用说明,供考生复习时参考。

书名	本书特点	本书使用说明
《数学复习全书·基础篇》	内容基础·提炼精准·易学易懂(推荐使用时间:2020 年 6 月—2020 年 12 月)	
	本书根据大纲的考试范围将考研所需复习内容提炼出来,形成考研数学的基础内容和复习逻辑,实现大学数学同考研数学之间的顺利过渡,开启考研复习第一篇。	考生复习过本校大学数学教材后,即可使用本书。如果大学没学过数学或者本校课本是自编教材,与考研大纲差别较大,也可使用本书替代大学数学教材。
《数学基础过关 660 题》	题目经典·体系完备·逻辑清晰(推荐使用时间:2020 年 9 月—2021 年 4 月)	
	本书主编团队出版 20 年的经典之作,一直被模仿,从未被超越。年销量达百万余册,是当之无愧的考研数学头号畅销书,拥有无数甘当“自来水”的粉丝读者,口碑爆棚,考研数学不可不入!“660”也早已成为考研数学的年度关键词。 本书重基础,重概念,重理论,一旦你拥有了《数学复习全书》《数学基础过关 660 题》教你的思维方式、知识逻辑、做题方法,你就能基础稳固、思维灵活,对知识、定理、公式的理解提升到新的高度,避免陷入复习中后期“基础不牢,地动山摇”的窘境。	与《数学复习全书·基础篇》搭配使用,在完成对基础知识的学习后,有针对性地做一些练习。帮助考生熟练掌握定理、公式和解题技巧,加强知识点的前后联系,将之体系化、系统化,分清重难点,让复习周期尽量缩短。 虽说书中都是选择题和填空题,同学们不要轻视,也不要一开始就盲目做题。看到一道题,要能分辨出是考哪个知识点,考什么,然后在做题过程中看看自己是否掌握了这个知识点,应用的定理、公式的条件是否熟悉,这样才算真正做好了一道题。
《数学历年真题全精解析·基础篇》	分类详解·注重基础·突出重点(推荐使用时间:2020 年 6 月—2020 年 12 月)	
	本书精选精析 1987—2008 年考研数学真题,帮助考生提前了解大学水平考试与考研选拔考试的差别,不会盲目自信,也不会妄自菲薄,真正跨入考研的门槛。	与《数学复习全书·基础篇》《数学基础过关 660 题》搭配使用,复习完一章,即可做相应的章节真题。不会做的题目做好笔记,二轮复习时的继续练习。

书名	本书特点	本书使用说明
《数学复习全书》	系统全面·深入细致·结构科学 （推荐使用时间：2021年2月—2021年7月）	
	本书为作者团队扛鼎之作，常年稳居各大平台考研图书畅销榜前列，主编之一的李永乐老师更是入选2019年“当当20周年白金作家”，考研界仅两位作者获此称号。 本书从基本理论、基础知识、基本方法出发，全面、深入、细致地讲解考研数学大纲要求的所有考点，不提供花拳绣腿的不实用技巧，也不提倡误人子弟的费时背书法，而是扎扎实实地带同学们深入每一个考点背后，找到它们之间的关联、逻辑，让同学们从知识点零碎、概念不清楚、期末考试过后即忘的“低级”水平，提升到考研必需的高度。	利用《数学复习全书·基础篇》把基本知识“捡”起来之后，再使用本书。本书有知识点的详细讲解和相应的练习题，有利于同学们建立考研知识体系和框架，打好基础。 在《数学基础过关660题》中若遇到不会做的题，可以放到这里来做。以章或节为单位，学习新内容前要复习前面的内容，按照一定的规律来复习。基础薄弱或中等偏下的考生，务必要利用考研当年上半年的时间，整体吃透书中的理论知识，摸清例题设置的原理和必要性，特别是对大纲中要求的基本概念、理论、方法要系统理解和掌握。
《数学历年真题全精解析》	真题真练·总结规律·提升技巧 （推荐使用时间：2021年7月—2021年11月）	
	本书完整收录2009—2021年考研数学的全部试题，将真题按考点分类，还精选了其他卷的试题作为练习题。力争做到考点全覆盖，题型多样，重点突出，不简单重复。书中的每道题给出的参考答案有常用、典型的解法，也有技巧性强的特殊解法。分析过程逻辑严谨、思路清晰，具有很强的可操作性，通过学习，考生可以独立完成对同类题的解答。	边做题、边总结，遇到“卡壳”的知识点、题目，回到《数学复习全书》和之前听过的基础课、强化课中去补，争取把每个真题知识点吃透、搞懂，不留死角。 通过做真题，进一步提高解题能力和技巧，满足实际考试的要求。第一阶段，浏览每年真题，熟悉题型和常考点。第二阶段，进行专项复习。
《高等数学辅导讲义》 《线性代数辅导讲义》 《概率论与数理统计辅导讲义》	经典讲义·专项突破·强化提高 （推荐使用时间：2021年7月—2021年10月）	
	三本讲义分别由作者的教学讲稿改编而成，系统阐述了考研数学的基础知识。书中例题都经过严格筛选、归纳，是多年经验的总结，对同学们的重点、难点的把握准确，有针对性。适合认真研读，做到举一反三。	哪科较薄弱，精研哪本。搭配《数学强化通关330题》一起使用，先复习讲义上的知识点，做章节例题、练习，再去听相关章节的强化课，做《数学强化通关330题》的相关习题，更有利于知识的巩固和提高。
《数学强化通关330题》	综合训练·突破重点·强化提高 （推荐使用时间：2021年5月—2021年10月）	
	强化阶段的练习题，综合训练必备。具有典型性、针对性、技巧性、综合性等特点，可以帮助同学们突破重点、难点，熟悉解题思路和方法，增强应试能力。	与《数学基础过关660题》互为补充，包含选择题、填空题和解答题。搭配《高等数学辅导讲义》《线性代数辅导讲义》《概率论与数理统计辅导讲义》使用，效果更佳。
《数学决胜冲刺6套卷》	冲刺模拟·有的放矢·高效提分 （推荐使用时间：2021年11月—2021年12月）	
	通过整套题的训练，对所学知识进行系统总结和梳理。不同于重点题型的练习，需要全面的知识，要综合应用。必要时应复习基本概念、公式、定理，准确记忆。	在精研真题之后，用模拟卷练习，找漏洞，保持手感。不要掐时间、估分，遇到不会的题目，回归基础，翻看以前的学习笔记，把每道题吃透。
《数学临阵磨枪》	查漏补缺·问题清零·从容应战 （推荐使用时间：考前20天）	
	本书是常用定理公式、基础知识的清单。最后阶段，大部分考生缺乏信心，感觉没复习完，本来会做的题目，因为紧张、压力，也容易出错。本书能帮助考生在考前查漏补缺，确保基础知识不丢分。	搭配《数学决胜冲刺6套卷》使用。上考场前，可以再次回忆、翻看本书。

无_{基础}不数学

——金榜时代

考研承诺书

为了自己的成长,为了有个美好的未来,本人自愿参加 2022 年硕士研究生考试。

本人郑重承诺:从_____年____月____日开始,我会全力以赴,不虚度时光,认真学习,不畏惧困难,不懈怠、不自欺,踏踏实实复习!

为自己去拼搏,让青春无悔!

只争朝夕,不负韶华!

承诺人:_____

见证人:_____

前言

微信公众号:顶尖考研
(ID:djky66)

本书是为报考硕士研究生的考生编写的数学复习备考用书,从 2002 年至今,已是总第 20 版了。20 年来,本书得到了广大考生的信任与好评,成为考生心目中基础复习必备题集。2022 版《数学基础过关 660 题》在 2021 版的基础上,进行了修订和调整,精益求精,全新升级,力争给考生的复习带来更大的益处。

本书内容包括高等数学、线性代数、概率论与数理统计,题型为选择题和填空题。在题目的编制设计上,我们的基本思路是:使同学们在选择题和填空题上得到充分的模拟训练,实现基础过关;而小题经重组整合就能成为综合题,故本书也为后续《数学强化通关 330 题》的解答题练习做好了充分的准备。为了方便考生复习,本书分为习题册和答案册。习题册中特意每道题预留了答题区域和纠错区域,考生在练习时注意要写下思路过程。小题要大做,不能凭感觉、运气选结果,要动笔练,这样后期回顾总结也会更加方便。

从教育部考试中心已公布的统计结果来看,2014~2019 年数学一的选择題、填空题难度

系数如下:

	2014 年	2015 年	2016 年	2017 年	2018 年	2019 年
选择题	0.600	0.695	0.509	0.595	0.513	0.615
填空题	0.367	0.504	0.431	0.560	0.433	0.386

是不是丢分丢得有点多了? 所以对于往届考生的失误要引以为戒,应当重视选择题、填空题的复习。

针对大多数考生基础薄弱、很长时间没有复习数学的实际情况,加大数学复习的强度是有必要的,一定量的练习是必不可少的。本书从各科的难度和需要考生掌握的程度出发,对一些旧、难题重新进行了编写。因此,《数学基础过关 660 题》是一本不可多得的复习用书。

硕士研究生入学考试的性质是“具有选拔功能的水平考试”,而考查考生对基础知识的掌握程度,是数学考试的重要目标之一,同时由于数学学科本身的特点,考生的数学成绩历来相关较大,这说明数学学科的考试选拔性质更加突出。近年来,一些考生的失误并不是因为缺乏灵活的思维和敏锐的感觉,而恰恰是因对数学大纲中规定的基础知识和基本理论的掌握还存在某些欠缺,甚至有所偏废所致。因此,希望广大考生要按考试大纲踏实、认真、全面、系统地复习,心态要平和,戒浮躁,要循序渐进、不断积累、逐步提高。

另外,为了更好地帮助考生进行复习,“李永乐考研数学辅导团队”特在新浪微博上开设答疑专区,考生在复习考研数学时,如若遇到任何问题,即可私信或在线留言,团队老师将尽心为你解答。请访问[新浪微博@清华李永乐考研数学辅导团队](#)。

@清华李永乐考研数学辅导团队



希望本书的修订再版能对考生的复习备考有更大的帮助。对书中不足和疏漏之处,恳请读者批评指正。

祝同学们复习顺利,心想事成,考研成功!

编者
2020 年 8 月

目录 Contents

基础过关 1 阶

高等数学

填空题 3

选择题 41

线性代数

填空题 94

选择题 116

概率论与数理统计

填空题 65

选择题 65

微信公众号: 顶尖考研
(ID: djky66)

基础过关 2 阶

高等数学

填空题 197

选择题 210

顶尖考研

顶尖考研

顶尖考研

顶尖考研

微信公众号【顶尖考研】

(ID: djky66)

顶尖考研

顶尖考研

顶尖考研
(ID: djky66)

顶尖考研

顶尖考研

顶尖考研

顶尖考研

顶尖考研

基础过关



微信公众号【顶尖考研】
(ID: djky66)

1 阶

微信公众号:顶尖考研
(ID:djky66)

关注公众号



微信公众号【顶尖考研】

(ID: djky66)

顶尖考研公众号
(ID: djky66)

顶尖考研公众号
(ID: djky66)

高等数学

填空题

1

设 $f(x) = \begin{cases} -1, & x < 0 \\ 0, & x = 0, g(x) = e^{2x-1} - e^{-x}, \text{ 则 } f(g(x)) = \end{cases}$ _____.



2

设 $f\left(x + \frac{1}{x}\right) = x^2 + \frac{1}{x^2}$, 则 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) =$ _____.



3

$I = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(e^{x^2} - 1)(\sqrt{1+x} - \sqrt{1-x})}{[\ln(1-x) + \ln(1+x)] \sin \frac{x}{1+x}} =$ _____.



微信公众号: 顶尖考研
(ID: djky66)

4

$$I = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\sin \frac{2}{x} + \cos \frac{1}{x} \right)^{x \cos \sqrt{\frac{x+1}{x^2}}} = \underline{\hspace{2cm}}.$$



5

$$I = \lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt[6]{x^6 + x^5} - \sqrt[6]{x^6 - x^5}) = \underline{\hspace{2cm}}.$$



微信公众号【顶尖考研】
(ID: djky66)

6

$$I = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \sin x^2 - 2(1 - \cos x) \sin x}{x^4} = \underline{\hspace{2cm}}.$$



顶尖考研公众号
(ID: djky66)

7

$$I = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1 - \sqrt{\cos x})(1 - \sqrt[3]{\cos x}) \cdots (1 - \sqrt[n]{\cos x})}{(1 - \cos x)^{n-1}} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

 答题
区域

 纠错
笔记

8

$$I = \lim_{x \rightarrow \infty} (e^{x^2} + x^3)^{\frac{1}{x^2}} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

 答题
区域

 纠错
笔记

微信公众号【顶尖考研】
(ID: djky66)

9

$$I = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_{x^2}^x \frac{\sin(xt)}{t} dt}{x^2} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

 答题
区域

 纠错
笔记

微信公众号:顶尖考研
(ID: djky66)

10

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2(2^{\frac{1}{x}} - 2^{\frac{1}{x+1}}) = \underline{\hspace{2cm}}.$$



11

$$\text{设 } \alpha > 0, \text{ 则 } \lim_{x \rightarrow 0^+} (x^2 + x)^{x^\alpha} = \underline{\hspace{2cm}}.$$



微信公众号【顶尖考研】
(ID: djky66)

12

$$\text{数列极限 } I = \lim_{n \rightarrow \infty} n^2 \left(\arctan \frac{2}{n} - \arctan \frac{2}{n+1} \right) = \underline{\hspace{2cm}}.$$



13 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\left(1 + \frac{1}{n} \right)^{\frac{n}{2}} - \sqrt{e} \right] = \underline{\hspace{2cm}}.$

 答题
区域

 纠错
笔记

14 设 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln \left(1 + x + \frac{f(x)}{x} \right)}{x} = 3$, 则 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^2} = \underline{\hspace{2cm}}.$

 答题
区域

 纠错
笔记

微信公众号【顶尖考研】
(ID: djky66)

15 设 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1-x) + xf(x)}{x^2} = 0$, 则 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - 1}{x} = \underline{\hspace{2cm}}.$

 答题
区域

 纠错
笔记

微信公众号:顶尖考研
(ID: djky66)

16

设函数 $f(x)$ 在 $x=1$ 连续, 且 $f(1)=1$, 则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln[2+f(x^{\frac{1}{x}})] =$ _____.



17

设 a, b 为常数, 且 $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt[3]{1-x^6} - ax^2 - b) = 0$, 则 $a =$ _____, $b =$ _____.



微信公众号【顶尖考研】
(ID: djky66)

18

设 a, b, p 为非零常数, 则 $I = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{a + be^{\frac{1}{x}}}{a - be^{\frac{1}{x}}} \cdot \frac{\sin px}{|x|} =$ _____.



19

设 $x_0 = 0, x_n = \frac{1+2x_{n-1}}{1+x_{n-1}} (n = 1, 2, 3, \dots)$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n =$ _____.



20

设 $f(x)$ 连续, 当 $x \rightarrow a$ 时, $f(x)$ 是 $x-a$ 的 n 阶无穷小, 则当 $x \rightarrow a$ 时 $\int_a^x f(t) dt$ 是 $x-a$ 的 _____ 阶无穷小. (填阶数)



微信公众号【顶尖考研】
(ID: djky66)

21

已知当 $x \rightarrow 0$ 时 $F(x) = \int_0^{x-\sin x} \ln(1+t) dt$ 是 x^n 的同阶无穷小, 则 $n =$ _____.



微信公众号: 顶尖考研
(ID: djky66)

22

设函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{\sin x(b\cos x - 1)}{e^x + a}, & x > 0 \\ \frac{\sin x}{\ln(1+3x)}, & x < 0 \end{cases}$ 在 $x=0$ 点极限存在, 则 a, b 分别为



23

设 $f(x) = \begin{cases} 6, & x \leq 0 \\ \frac{e^{ax^3} - 1}{x - \arcsin x}, & x > 0 \end{cases}, g(x) = \begin{cases} \frac{3\sin(x-1)}{x-1}, & x < 1 \\ e^{bx} + 1, & x \geq 1 \end{cases}$

若 $f(x) + g(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 连续, 则 $a =$ 且 $b =$.



24

设 $f(x) = \frac{e^x - b}{(x-a)(x-b)}$ 有无穷间断点 $x=e$, 可去间断点 $x=1$, 则 $(a, b) =$.



25

设 $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x + x^2 e^{nx}}{1 + e^{nx}}$, 则 $f(x)$ 的连续区间是_____.



26

设 $f(x) = \begin{cases} \arctan x, & x \leq 1 \\ \frac{1}{2}(e^{x^2-1} - x) + \frac{\pi}{4}, & x > 1 \end{cases}$, 则 $f'(x) =$ _____.



微信公众号【顶尖考研】
(ID: djky66)

27

设 $f(x) = \begin{cases} \frac{\ln(1+bx)}{x}, & x \neq 0 \\ -1, & x = 0 \end{cases}$, 其中 b 为某常数, $f(x)$ 在定义域上处处可导, 则

$f'(x) =$ _____.



微信公众号: 顶尖考研
(ID: djky66)

- 28 设 $f(x) = \begin{cases} x^2, & x \leq 0 \\ x^\alpha \sin \frac{1}{x}, & x > 0 \end{cases}$, 若 $f(x)$ 可导, 则 α 应满足 _____; 若 $f'(x)$ 连续, 则 α 应满足 _____.



- 29 设 $f(x)$ 是以 3 为周期的可导函数且是偶函数, $f'(-2) = -1$, 则 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{h}{f(5-2\sin h) - f(5)} = \underline{\hspace{2cm}}$.



- 30 设 $f(x)$ 在 $x=0$ 可导且 $f(0)=1, f'(0)=3$, 则数列极限 $I = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(f\left(\frac{1}{n}\right) \right)^{\frac{1}{1-\cos \frac{1}{n}}} = \underline{\hspace{2cm}}$.



31

设 $f(x)$ 在 $x = a$ 处二阶导数存在, 则

$$I = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{f(a+h) - f(a)}{h} - f'(a)}{h} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

 答题
区域

 纠错
笔记

32

设 $f(x) = x^{\sin x} (x > 0)$, 则 $f'(x) = \underline{\hspace{2cm}}.$
 答题
区域

 纠错
笔记

微信公众号【顶尖考研】
(ID: djky66)

33

设 $f(x) = x^2(x+1)^2(x+2)^2 \cdots (x+n)^2$, 则 $f''(0) = \underline{\hspace{2cm}}.$
 答题
区域

 纠错
笔记

微信公众号: 顶尖考研
(ID: djky66)

34

设 $y = y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x = \frac{1}{2} \ln(1+t^2) \\ y = \arctan t \end{cases}$ 确定, 则 $\frac{dy}{dx} =$ _____,

$\frac{d^2y}{dx^2} =$ _____. $y = y(x)$ 在任意点处的曲率 $K =$ _____.



35


设 $y = y(x)$ 由方程 $y = \sin(x+y)$ 确定, 则 $\frac{d^2y}{dx^2} =$ _____.



微信公众号【顶尖考研】
(ID: djky66)

36

设 $y = x + e^x$, 则其反函数的二阶导数 $\frac{d^2x}{dy^2} =$ _____.



37

设 $f(x) = \int_0^x \ln(1 + \sin t) dt$, 则 $f''(x) =$ _____.



38

设函数 $y = y(x)$ 为由方程 $x^2 + \int_0^y (2 + \sin t^2) dt = 1$ 确定的隐函数, 则 $dy =$ _____.



微信公众号【顶尖考研】
(ID: djky66)

39

设 $y = y(x)$ 在 $(-1, 1)$ 二阶可导, 满足方程: $(1 - x^2) \frac{d^2 y}{dx^2} - x \frac{dy}{dx} + a^2 y = 0$, 作变量替换 $x = \sin t$ 后, y 作为 t 的函数满足的方程是 _____.



微信公众号: 顶尖考研
(ID: djky66)

40

设 $f(x) = \ln \frac{1-2x}{1+3x}, n \geq 2$, 则 $f^{(n)}(0) =$ _____.



41

设 $f(x) = \frac{\arcsin x}{\sqrt{1-x^2}}$, 则 $f^{(n)}(0) =$ _____.



微信公众号【顶尖考研】
(ID: djky66)

42

设 $y = y(x)$ 是由方程 $2y^3 - 2y^2 + 2xy - x^2 = 1$ 确定的, 则 $y = y(x)$ 的极值点是



本题有视频讲解哟, 答案册扫码。



43

函数 $y = \frac{(x-3)^2}{4(x-1)}$ 的单调增区间是 _____, 单调减区间是 _____, 极值是 _____, 凹区间是 _____, 凸区间是 _____.



44

设 $(1, 3)$ 是曲线 $y = x^3 + ax^2 + bx + 14$ 的拐点, 则 $a =$ _____, $b =$ _____.



微信公众号【顶尖考研】
(ID: djky66)

45

设 $f(x) = 3x^2 + Ax^{-3} (x > 0)$, A 为正常数, 则 A 至少为 _____ 时, 有 $f(x) \geq 20 (x > 0)$.



微信公众号: 顶尖考研
(ID: djky66)

46 函数 $f(x) = |4x^3 - 18x^2 + 27|$ 在 $[0, 2]$ 上的最小值等于_____, 最大值等于_____.



47 设有界函数 $f(x)$ 在 $(c, +\infty)$ 内可导, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = b$, 则 $b =$ _____.



微信公众号【顶尖考研】
(ID: djky66)

48 曲线 $y = \sqrt{4x^2 + x} \ln\left(2 + \frac{1}{x}\right)$ 的全部渐近线是_____.



49 设函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{e^x - 1} = 2$, 则曲线 $y = f(x)$ 在 $x=0$ 处的法线方程为_____.



50 设 $y = y(x)$ 二阶可导, 且 $\frac{dy}{dx} = (4-y)y^\beta (\beta > 0)$, 若 $y = y(x)$ 的一个拐点是 $(x_0, 3)$, 则 $\beta =$ _____.



微信公众号【顶尖考研】
(ID: djky66)

51 已知 $\int f'(x^3) dx = x^3 + C$ (C 为任意常数), 则 $f(x) =$ _____.



微信公众号: 顶尖考研
(ID: djky66)

52

$$I = \int \sqrt{\frac{3-2x}{3+2x}} dx = \underline{\hspace{2cm}}.$$



53


$$I = \int \frac{\sqrt{x+1}+2}{(x+1)^2 - \sqrt{x+1}} dx = \underline{\hspace{2cm}}.$$



微信公众号【顶尖考研】
(ID: djky66)

54

$$I = \int \frac{xe^x}{\sqrt{1+e^x}} dx = \underline{\hspace{2cm}}.$$



55

$$I = \int \frac{dx}{x^2(1-x^4)} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

 答题
区域

 纠错
笔记

56

$$I = \int \frac{\sin x}{\sin x + \cos x} dx = \underline{\hspace{2cm}}.$$

 答题
区域

 纠错
笔记

微信公众号【顶尖考研】
(ID: djky66)

57

$$I = \int \frac{dx}{x \sqrt{x^4+1}} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

 答题
区域

 纠错
笔记

微信公众号:顶尖考研
(ID: djky66)

58

设 $f(x) = x^2 - x \int_0^2 f(x) dx + 2 \int_0^1 f(x) dx$, 则 $f(x) =$ _____.



59


设 $f(x)$ 有一阶导数且满足 $\int_0^1 f(tx) dt = f(x) + x \sin x$, 则 $f(x) =$ _____.



微信公众号【顶尖考研】
(ID: djky66)

60

$I = \int_0^1 (\sqrt{2x-x^2} - \sqrt{(1-x^2)^3}) dx =$ _____.



61

设 $f(x)$ 为连续函数, a, b 为常数, $a^2 + b^2 \neq 0$, $\int_0^{2\pi} f(a \cos x + b \sin x) dx =$

$A \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} f(\sqrt{a^2 + b^2} \sin x) dx$, 则 $A =$ _____.

 答题
区域

 纠错
笔记

62

$f(x) = \begin{cases} xe^{-x^2}, & x \geq 0 \\ \frac{1}{1 + \cos x}, & -1 < x < 0 \end{cases}$, 则 $\int_1^4 f(x-2) dx =$ _____.

 答题
区域

 纠错
笔记

微信公众号【顶尖考研】
(ID: djky66)

63

设 $f(x)$ 是定义于 $x \geq 1$ 的正值连续函数, 则

$$F(x) = \int_1^x \left[\left(\frac{2}{t} + \ln t \right) - \left(\frac{2}{t} + \ln t \right) \right] f(t) dt \quad (x \geq 1)$$

的极小值点是 $x =$ _____.

 答题
区域

 纠错
笔记

微信公众号: 顶尖考研
(ID: djky66)

64

定积分 $I = \int_0^{\pi} \frac{x \sin x}{1 + \cos^2 x} dx = \underline{\hspace{2cm}}.$



65

设 $f(x) = \max\{1, x^2\}$, 则 $\int_1^x f(t) dt = \underline{\hspace{2cm}}.$



微信公众号【顶尖考研】
(ID: djky66)

66

在曲线 $y = x^2 (0 \leq x \leq 1)$ 上取一点 (t, t^2) , $(0 < t < 1)$, 设 A_1 是曲线 $y = x^2 (0 \leq x \leq 1)$, 直线 $y = t^2$ 和 $x = 0$ 围成的面积; A_2 是由曲线 $y = x^2 (0 \leq x \leq 1)$, 直线 $y = t^2$ 和 $x = 1$ 围成的面积, 则 t 取 $\underline{\hspace{2cm}}$ 时 $A = A_1 + A_2$ 取最小值.



67

$$\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x\sqrt{2x^2-1}} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

 答题
区域

 纠错
笔记

68

$$I = \int_1^{+\infty} \left[\frac{2x^2 + bx + a}{x(2x+a)} - 1 \right] dx = 1, \text{ 则 } a = \underline{\hspace{2cm}}, b = \underline{\hspace{2cm}}.$$

 答题
区域

 纠错
笔记

微信公众号【顶尖考研】
(ID: djky66)

69

$$\int_0^{+\infty} \frac{xe^{-x}}{(1+e^{-x})^2} dx = \underline{\hspace{2cm}}.$$

 答题
区域

 纠错
笔记

微信公众号:顶尖考研
(ID: djky66)

70

摆线 $x = a(t - \sin t), y = a(1 - \cos t) (0 \leq t \leq 2\pi)$ 与 x 轴围成图形绕 $y = 2a$ 旋转一周而得旋转体的体积 $V =$ _____.




71

设星形线方程为

$$\begin{cases} x = a\cos^3 t \\ y = a\sin^3 t \end{cases}$$

则它所围成的面积 A 为 _____, 它的弧长 L 为 _____, 它绕 x 轴旋转而生成的旋转体体积 V 为 _____, 该旋转体的侧面积 $S =$ _____.



72

设有曲线 $y = \sqrt{x-1}$, 过原点作其切线, 则以曲线、切线及 x 轴所围成平面图形绕 x 轴旋转一圈所得到的表面积为 _____.




73

已知抛物叶形线的一部分:

$$y^2 = \frac{x}{9}(3-x)^2 (0 \leq x \leq 3)$$

如图所示,它围成的图形为 M , 则 M 的面积 $A =$ _____, M 的质心(形心) $(\bar{x}, \bar{y}) =$ _____.




答题区域

纠错笔记

74

在水平放置的椭圆底柱形容器内储存某种液体,容器的尺寸如图所示,其中椭圆方程为 $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$ (单位:m), 则当液面过点

$(0, y) (-1 \leq y \leq 1)$ 处水平线时,容器内液体的体积是 _____, 当容器内储满了液体后,以 $0.16 \text{ m}^3/\text{min}$ 的速度将液体从容器顶端抽出,则当液面降至 $y = 0$ 时,液面下降的速度为 _____, 如果液体的密度为 1000 kg/m^3 , 抽出全部液体所做的功为 _____.



答题区域

纠错笔记

75

设无穷长直线 L 的线密度为 1, 引力常数为 k , 则 L 对距直线为 a 的单位质点 A 的引力为 _____.

答题区域

纠错笔记

微信公众号: 顶尖考研
(ID: djky66)

76 设 $y = y(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 可导, 在 $\forall x \in (0, +\infty)$ 处的增量 $\Delta y = y(x + \Delta x) - y(x)$ 满足 $\Delta y(1 + \Delta y) = \frac{y\Delta x}{1+x} + \alpha$, 其中 α 当 $\Delta x \rightarrow 0$ 时是与 Δx 等价的无穷小, 又 $y(0) = 1$, 则 $y(x) =$ _____.



77 设 $a > 0$ 是常数, 连续函数 $f(x)$ 满足 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = b$, $y = y(x)$ 是微分方程 $y' + ay = f(x)$ 的解, 则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} y(x) =$ _____.



78 若通过点 $(1, 0)$ 的曲线 $y = y(x)$ 上每一点 (x, y) 处切线的斜率等于 $1 + \frac{y}{x} + \left(\frac{y}{x}\right)^2$, 则此曲线的方程是 _____.



79

方程 $\frac{dy}{dx} = \frac{y}{x+y^4}$ 的通解为_____.



80

微分方程 $yy'' + 2(y')^2 = 0$ 满足初始条件 $y(0) = 1, y'(0) = -1$ 的特解是_____.



微信公众号【顶尖考研】
(ID: djky66)

81

方程 $y'' + y' - 2y = (6x+2)e^x$ 满足 $y(0) = 3, y'(0) = 0$ 的特解 $y^* =$ _____.



微信公众号:顶尖考研
(ID: djky66)

82

已知连续函数 $f(x)$ 满足 $\int_0^x f(t)dt = x + \sin x + \int_0^x tf(x-t)dt$, 则 $f(x) =$ _____.



83

设 $y = y(x)$ 是二阶常系数线性微分方程 $y'' + 2my' + n^2y = 0$ 满足 $y(0) = a$ 与 $y'(0) = b$ 的特解, 其中 $m > n > 0$, 则 $\int_0^{+\infty} y(x)dx =$ _____.



微信公众号【顶尖考研】
(ID: djky66)

84

已知 $y_1 = xe^x + e^{2x}$, $y_2 = xe^x + e^{-x}$, $y_3 = xe^x + e^{2x} - e^{-x}$ 是某二阶线性非齐次微分方程的三个解, 则此微分方程为 _____.



顶尖考研 公众号
(ID: djky66)

85

设 $u = u(\sqrt{x^2 + y^2})$ ($r = \sqrt{x^2 + y^2} > 0$) 有二阶连续的偏导数, 且满足

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} - \frac{1}{x} \frac{\partial u}{\partial x} + u = x^2 + y^2$$

则 $u(\sqrt{x^2 + y^2}) =$ _____.



86

设 $f(x, y) = \frac{x^2 + y^2}{e^{xy} + xy \sqrt{x^2 + y^2}}$, 则 $f'_x(1, 0) =$ _____.



微信公众号【顶尖考研】
(ID: djky66)

87

设 $z = e^x + y^2 + f(x + y)$, 且当 $y = 0$ 时, $z = x^3$, 则 $\frac{\partial z}{\partial x} =$ _____.



微信公众号: 顶尖考研
(ID: djky66)

88

设 $z = (x - 2y)^{y-2x}$, 则 $\left. \frac{\partial z}{\partial x} \right|_{\substack{x=1 \\ y=0}} =$ _____.



89

设 $f(x, y) = \ln |x + y| - \sin(xy)$, 则 $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}$ 在点 $(1, \pi)$ 处的值为 _____.



微信公众号【顶尖考研】
(ID: djky66)

90

设 $f(u, v)$ 是二元可微函数, $z = f(x^y, y^{2x})$, 则 $\frac{\partial z}{\partial x} =$ _____.



91

设 $z = e^{xy} + f(x+y, xy)$, $f(u, v)$ 有二阶连续偏导数, 则 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} =$ _____.



92

已知函数 $z = f(x, y)$ 在点 $(1, 2)$ 处可微, 且 $f(1, 2) = 1, f'_x(1, 2) = 2, f'_y(1, 2) = 3$, 设函数 $\varphi(x) = f(x, 2f(x, 2x))$, 则 $\varphi'(1) =$ _____.



微信公众号【顶尖考研】
(ID: djky66)

93

设函数 $f(u, v)$ 具有二阶连续偏导数, 且满足 $4 \frac{\partial^2 f}{\partial u^2} - \frac{\partial^2 f}{\partial v^2} = 1$, 又 $g(x, y) = f(x^2 + y^2, xy)$, 则 $\frac{\partial^2 g}{\partial x^2} - \frac{\partial^2 g}{\partial y^2} =$ _____.



微信公众号: 顶尖考研
(ID: djky66)

94 设 $z = \int_0^1 |xy - t| f(t) dt, 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1$, 其中 $f(x)$ 为连续函数, 则 $z''_{xx} + z''_{yy} =$ _____.

 答题区域

 纠错笔记

95 设 $f(x), g(x)$ 可微, $u(x, y) = f(2x + 5y) + g(2x - 5y)$, 且满足 $u(x, 0) = \sin 2x$, $u'_y(x, 0) = 0$, 则 $f(x) =$ _____.

 答题区域

 纠错笔记

微信公众号【顶尖考研】
(ID: djky66)

96 设 $z = f(x, y)$ 满足 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = x + y$, 且 $f(x, 0) = x, f(0, y) = y^2$, 则 $f(x, y) =$ _____.

 答题区域

 纠错笔记

顶尖考研 公众号
(ID: djky66)

97

设连续函数 $z = f(x, y)$ 满足 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 1}} \frac{f(x, y) - 2x + y - 2}{\sqrt{x^2 + (y-1)^2}} = 0$, 则 $\left. \mathrm{d}z \right|_{(0,1)} = \underline{\hspace{2cm}}$.

 答题区域

 纠错笔记

98

设 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处连续, 且 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{f(x, y) - a - bx - cy}{\ln(1 + x^2 + y^2)} = 1$, 其中 a, b, c 为常数, 则 $\left. \mathrm{d}f(x, y) \right|_{(0,0)} = \underline{\hspace{2cm}}$.

 答题区域

 纠错笔记

99

设 $(ax^2y^2 - 2xy^2)\mathrm{d}x + (2x^3y + bx^2y + 1)\mathrm{d}y$ 是一个函数 $f(x, y)$ 的全微分, 则 $a = \underline{\hspace{1cm}}, b = \underline{\hspace{1cm}}, f(x, y) = \underline{\hspace{2cm}}$.

 答题区域

 纠错笔记

100

设 $f(x, y, z) = e^x + y^2z$, 其中 $z = z(x, y)$ 是由方程 $x + y + z + xyz = 0$ 所确定的隐函数, 则 $f'_x(0, 1, -1) = \underline{\hspace{2cm}}$.

 答题区域

 纠错笔记

微信公众号: 顶尖考研
(ID: djky66)

101 若函数 $z = z(x, y)$ 由方程 $e^{x+2y+3z} + xyz = 1$ 确定, 则 $\left. \frac{dz}{dx} \right|_{(0,0)} = \underline{\hspace{2cm}}$.



102 设函数 $f(u, v)$ 可微, $z = z(x, y)$ 由方程 $(x+1)z - y^2 = x^2 f(x-z, y)$ 确定, 则 $\left. \frac{dz}{dy} \right|_{(0,1)} = \underline{\hspace{2cm}}$.



微信公众号【顶尖考研】

103 设 $f(x)$ 为连续函数, 且 $x^2 + y^2 + z^2 = \int_x^y f(x+y-t) dt$ 确定二元函数 $z = z(x, y)$, 则 $z\left(\frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y}\right) = \underline{\hspace{2cm}}$.



104 二元函数 $f(x, y) = x^2(2+y^2) + y \ln y$ 的极小值为 $\underline{\hspace{2cm}}$.



105

设方程式 $x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 2y - 4z - 10 = 0$ 确定某隐函数 $z = z(x, y) > 0$, 则 $z = z(x, y)$ 的极_____值点是_____, 相应的极值是_____.



106

设 $a > 0$, 交换积分次序 $\int_0^a dy \int_0^{\sqrt{ay}} f(x, y) dx + \int_a^{2a} dy \int_0^{2a-y} f(x, y) dx =$ _____.



107

交换积分次序 $\int_0^1 dx \int_0^{x^2} f(x, y) dy + \int_1^3 dx \int_0^{\frac{1}{2}(3-x)} f(x, y) dy =$ _____.



108

将直角坐标系下的累次积分转换成极坐标系下的累次积分并计算

$$I = \int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}R} e^{-y^2} dy \int_0^y e^{-x^2} dx + \int_{\frac{\sqrt{2}}{2}R}^R e^{-y^2} dy \int_0^{\sqrt{R^2-y^2}} e^{-x^2} dx = \underline{\hspace{2cm}}.$$



微信公众号: 顶尖考研
(ID: djky66)

109

交换积分次序 $\int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{2\cos\theta} f(r\cos\theta, r\sin\theta) r dr = \underline{\hspace{2cm}}.$



110

计算 $\int_0^1 dx \int_{1-x}^{\sqrt{1-x^2}} \frac{x+y}{x^2+y^2} dy = \underline{\hspace{2cm}}.$



111

计算 $\int_0^1 dx \int_{x^2}^1 \frac{xy}{\sqrt{1+y^3}} dy = \underline{\hspace{2cm}}.$



112

计算 $\int_0^1 dy \int_{\arcsin y}^{\pi - \arcsin y} \cos^2 x dx = \underline{\hspace{2cm}}.$



微信公众号: 顶尖考研
(ID: djky66)

113

计算 $\iint_{x^2+y^2 \leq 1} (x^2+2y) d\sigma =$ _____.



纠错
笔记

114

设 D 为圆域 $x^2+y^2 \leq 2x+2y$, 则 $\iint_D xy dx dy =$ _____.



纠错
笔记

115

设 $D = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\}$, 则 $\iint_D \frac{dx dy}{\sqrt{x^2+y^2}} =$ _____.



纠错
笔记

本题有视频讲解哟, 答案册扫码.

116

设 $D = \{(x, y) \mid -1 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 2\}$, 则 $I = \iint_D \sqrt{|y-x^2|} dx dy =$ _____.



纠错
笔记

微信公众号: 顶尖考研
(ID: djky66)

117 设 $f(x)$ 为连续函数, $F(x) = \int_1^x dv \int_v^x f(u) du (x > 1)$, 则 $F'(x) =$ _____.

 答题区域

 纠错笔记

118 设 $f(x, y)$ 为连续函数, 且 $f(x, y) = \frac{1}{\pi} \sqrt{x^2 + y^2} \iint_{x^2 + y^2 \leq 1} f(x, y) d\sigma + y^2$, 则 $f(x, y) =$ _____.

 答题区域

 纠错笔记

微信公众号【顶尖考研】

119 设积分区域 $D = \{(x, y) \mid 1 \leq x^2 + y^2 \leq e^2\}$, 则 $\iint_D x^2 \ln(x^2 + y^2) d\sigma =$ _____.

 答题区域

 纠错笔记

120 设积分区域 D 由曲线 $y = \ln x$ 以及直线 $x = 2, y = 0$ 围成, 则 $\iint_D \frac{e^{xy}}{x^x - 1} d\sigma =$ _____.

 答题区域

 纠错笔记

选 择 题

121 设有下列命题

- ① 数列 $\{x_n\}$ 收敛(即 $\exists$ 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$), 则 x_n 有界.
 ② 数列极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} x_{n+l} = a$. 其中 l 为某个确定的正整数.
 ③ 数列 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} x_{2n-1} = \lim_{n \rightarrow \infty} x_{2n} = a$.
 ④ 数列极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n \exists \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1}}{x_n} = 1$.

则以上命题中正确的个数是

- (A) 1. (B) 2. (C) 3. (D) 4.

答案
区域纠错
笔记

微信公众号【顶尖考研】
(ID: djky66)

122 设 $1 < a \leq e^{\frac{1}{e}}$, $x_1 = a, x_2 = a^{x_1}, \dots, x_n = a^{x_{n-1}}, \dots$, 则

- (A) 数列 $\{x_n\}$ 单调增, 但是没有极限. (B) 数列 $\{x_n\}$ 单调增, 且有极限.
 (C) 数列 $\{x_n\}$ 单调减, 但是没有极限. (D) 数列 $\{x_n\}$ 单调减, 且有极限.

答案
区域纠错
笔记

微信公众号: 顶尖考研
(ID: djky66)

123 有以下命题: 设 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A, \lim_{x \rightarrow a} g(x)$ 不 $\exists, \lim_{x \rightarrow a} h(x)$ 不 $\exists$,

① $\lim_{x \rightarrow a} (f(x) \cdot g(x))$ 不 $\exists$.

② $\lim_{x \rightarrow a} (g(x) + h(x))$ 不 $\exists$.

③ $\lim_{x \rightarrow a} (h(x) \cdot g(x))$ 不 $\exists$.

④ $\lim_{x \rightarrow a} (g(x) + f(x))$ 不 $\exists$.

则以上命题中正确的个数是

(A) 0.

(B) 1.

(C) 2.

(D) 3.



答案
区域



纠错
笔记

124

设函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{\ln(x-1)}{(x-1)(x-2)}, & x \in (1, 2) \cup (2, +\infty) \\ 0, & x = 2 \end{cases}$, 则 $f(x)$

(A) 在 $(1, 2)$ 区间有界.

(B) 在 $(2, +\infty)$ 区间有界.

(C) 在 $(1, +\infty)$ 区间有界.

(D) 在 $(1, 2)$ 和 $(2, +\infty)$ 区间都无界.



答案
区域



纠错
笔记

125

下列命题中正确的是

(A) 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \geq \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) \Rightarrow \exists \delta > 0$, 当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时 $f(x) \geq g(x)$.

(B) 若 $\exists \delta > 0$ 使得当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时有 $f(x) > g(x)$ 且 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A_0$, $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = B_0$ 均 $\exists$, 则 $A_0 > B_0$.

(C) 若 $\exists \delta > 0$, 当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时 $f(x) > g(x) \Rightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \geq \lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$.

(D) 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) > \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) \Rightarrow \exists \delta > 0$, 当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时有 $f(x) > g(x)$.



答案
区域



纠错
笔记

126

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sin^2(\pi \sqrt{n^2 + n}) =$$

(A) 1.

(B) $\frac{3}{4}$.(C) $\frac{1}{2}$.(D) $\frac{1}{4}$.

本题有视频讲解哟, 答案册扫码.

127

当 $n \rightarrow \infty$ 时, $e - \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$ 与 An^{-p} 为等价无穷小, 则

(A) $A = \frac{e}{3}, p = 1$.(B) $A = \frac{e}{2}, p = 1$.(C) $A = \frac{e}{3}, p = 2$.(D) $A = \frac{e}{2}, p = 2$.

128

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n^2 + n + 1} + \frac{2}{n^2 + n + 2} + \cdots + \frac{n}{n^2 + n + n} \right) =$$

(A) 3.

(B) 2.

(C) $\frac{2}{3}$.(D) $\frac{1}{2}$.

微信公众号: 顶尖考研
(ID: djky66)

129 $f(x) = \frac{\sin \pi x}{x-1} e^{\frac{1}{(x-1)^3}}$, 则当 $x \rightarrow 1$ 时有

(A) $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = -\pi$.

(B) $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 0$.

(C) $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \infty$.

(D) $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ 不存在, 且 $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) \neq \infty$.



答题
区域



纠错
笔记

130 $I = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(xe^x) - e^{-\frac{x^2}{2}e^{2x}}}{x^4} =$

(A) 0.

(B) $-\frac{1}{6}$.

(C) $-\frac{1}{8}$.

(D) $-\frac{1}{12}$.



答题
区域



纠错
笔记

131 若 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos 2x - \sqrt{\cos 2x}}{x^k} = a \neq 0$, 则

(A) $k = 2, a = 1$.

(B) $k = -2, a = -1$.

(C) $k = 2, a = -2$.


(D) $k = 2, a = -1$.



答题
区域



纠错
笔记



132 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(\sin x) - \cos x}{(1 - \cos x) \sin^2 x} =$

- (A) 1. (B) $\frac{1}{2}$. (C) $\frac{1}{3}$. (D) 0.



133

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\left(1 + \frac{1}{x}\right)^{x^2}}{e^x} =$$

- (A) 0. (B) $e^{-\frac{1}{4}}$. (C) $e^{-\frac{1}{3}}$. (D) $e^{-\frac{1}{2}}$.



本题有视频讲解哟, 答案册扫码。

微信公众号【顶尖考研】
(ID: djky66)

134

已知 $I = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{ax^2 + bx + 1 - e^{x^2-2x}}{x^2} = 2$, 则

- (A) $a = 5, b = -2$. (B) $a = -2, b = 5$.
(C) $a = 2, b = 0$. (D) $a = 3, b = -3$.



微信公众号: 顶尖考研
(ID: djky66)

135 设 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 6x - (\sin x)f(x)}{x^3} = 0$, 则 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{6 - f(x)}{x^2} =$

- (A) 0. (B) 35. (C) 36. (D) ∞ .



136 下列各题计算过程中正确无误的是

(A) 数列极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(\ln n)'}{n'} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$.

(B) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sin \pi x}{3x^2 - 2x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\pi \cos \pi x}{6x - 2} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{-\pi^2 \sin \pi x}{6} = 0$.


(C) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 \sin \frac{1}{x}}{\sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x \sin \frac{1}{x} - \cos \frac{1}{x}}{\cos x}$ 不存在.

(D) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x + \sin x}{x - \sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 + \cos x}{1 - \cos x} = \infty$.



137 当 $n \rightarrow \infty$ 时, 数列 $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n - e$ 是 $\frac{1}{n}$ 的

- (A) 高阶无穷小. (B) 低阶无穷小.
(C) 等价无穷小. (D) 同阶但非等价无穷小.



138 当 $x \rightarrow 0$ 时下列无穷小中阶数最高的是

(A) $(1+x)^{x^2} - 1$.

(B) $e^{x^4-2x} - 1$.

(C) $\int_0^{x^2} \sin t^2 dt$.

(D) $\sqrt{1+2x} - \sqrt[3]{1+3x}$.



139 设 $x \rightarrow a$ 时 $f(x)$ 与 $g(x)$ 分别是 $x-a$ 的 n 阶与 m 阶无穷小, 则下列命题

① $f(x)g(x)$ 是 $x-a$ 的 $n+m$ 阶无穷小.

② 若 $n > m$, 则 $\frac{f(x)}{g(x)}$ 是 $x-a$ 的 $n-m$ 阶无穷小.

③ 若 $n \leq m$, 则 $f(x) + g(x)$ 是 $x-a$ 的 n 阶无穷小.

④ 若 $f(x)$ 连续, 则 $\int_a^x f(t) dt$ 是 $x-a$ 的 $n+1$ 阶无穷小.

中, 正确的个数是

(A) 1.

(B) 2.

(C) 3.

(D) 4.



140

设 $f(x) = \int_0^x t e^{\sin t} dt$, 则当 $x \rightarrow 0$ 时, $f(x)$ 为无穷小 x 的阶为

(A) 一阶.

(B) 二阶.

(C) 三阶.

(D) 四阶.



微信公众号: 顶尖考研
(ID: djky66)

141 以下函数 $f(g(x))$ 以 $x=0$ 为第二类间断点的是

(A) $f(u) = \ln(1+u^2), g(x) = \begin{cases} \sin^2 x + (x+1)^2, & x \leq 0 \\ x^2 + 1, & x > 0 \end{cases}$

(B) $f(u) = \begin{cases} 1-u, & u \leq 0 \\ u^2+1, & u > 0 \end{cases}, g(x) = 2\cos x - 1$

(C) $f(u) = \begin{cases} \frac{\ln(1-u^2)}{u} \sin \frac{1}{u}, & u < 0 \\ 1 - \cos \sqrt{u}, & u \geq 0 \end{cases}, g(x) = \begin{cases} x, & x < 0 \\ x + \frac{\pi^2}{4}, & x \geq 0 \end{cases}$

(D) $f(u) = e^{u^2} + 1, g(x) = \begin{cases} \frac{1}{x}, & x < 0 \\ 0, & x = 0 \\ \sin \frac{1}{x}, & x > 0 \end{cases}$



答题
区域



纠错
笔记

142 设 $f(x) = \frac{1}{\arctan \frac{x-1}{x}}$, 则

(A) $x=0$ 与 $x=1$ 都是 $f(x)$ 的第一类间断点.

(B) $x=0$ 与 $x=1$ 都是 $f(x)$ 的第二类间断点.

(C) $x=0$ 是 $f(x)$ 的第一类间断点, $x=1$ 是 $f(x)$ 的第二类间断点.

(D) $x=0$ 是 $f(x)$ 的第二类间断点, $x=1$ 是 $f(x)$ 的第一类间断点.



答题
区域



纠错
笔记

143 设 $f(x)$ 在点 x_0 的某邻域内有定义, 且 $f(x)$ 在 x_0 间断, 则在点 x_0 处必定间断的函数是

(A) $f(x) \sin x$.

(B) $f(x) + \sin x$.

(C) $f^2(x)$.

(D) $|f(x)|$.



答题
区域



纠错
笔记

144 “ $f(x)$ 在 x_0 点连续”是 $|f(x)|$ 在 x_0 点连续的

- (A) 充分条件,但不是必要条件. (B) 必要条件,但不是充分条件.
(C) 充分必要条件. (D) 既不是充分条件,也不是必要条件.



答案
区域



纠错
笔记

145 设 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 连续,则“ $\exists x_n \in [a, +\infty)$, 有 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty$ 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = \infty$ ”

是 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 无界的

- (A) 充分非必要条件. (B) 必要非充分条件.
(C) 充要条件. (D) 既非充分又非必要条件.



答案
区域



纠错
笔记

本题有视频讲解哟,答案册扫码.

微信公众号【顶尖考研】
(ID: djky66)

146

设 $f(x) = \begin{cases} \frac{1 - \cos x^2}{x^3}, & x > 0 \\ g(x) \arcsin^2 x, & x \leq 0 \end{cases}$, 其中 $g(x)$ 是有界函数,则 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处

- (A) 极限不存在. (B) 极限存在,但不连续.
(C) 连续,但不可导. (D) 可导.



答案
区域



纠错
笔记

147 设 $f(x) = \begin{cases} e^{\frac{1}{x^2-1}}, & |x| < 1 \\ x^4 - bx^2 + c, & |x| \geq 1 \end{cases}$ 可导, 则 $(b, c) =$

(A) $(2, 1)$.

(B) $(1, 0)$.

(C) $(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2})$.

(D) $(3, 2)$.



148 下列函数 $f(x)$ 中, 导函数 $f'(x)$ 在 $x = 0$ 处不连续的是

(A) $f(x) = \begin{cases} x^{\frac{4}{3}} \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$

(B) $f(x) = \begin{cases} \frac{\sin x}{x}, & x \neq 0 \\ 1, & x = 0 \end{cases}$

(C) $f(x) = \begin{cases} \frac{e^x - 1}{x}, & x \neq 0 \\ 1, & x = 0 \end{cases}$

(D) $f(x) = \begin{cases} \frac{\ln(1+x)}{x}, & x \neq 0 \\ 1, & x = 0 \end{cases}$



149 设 $f(0) = 0$, 则 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x^2)}{x^2}$ 存在是 $f(x)$ 在 $x = 0$ 可导的

(A) 充分非必要条件.

(B) 必要非充分条件.

(C) 充分必要条件.

(D) 既非充分又非必要条件.



150

设 $f(x)$ 是以 3 为周期的可导函数且 $f'(4) = 1$, 则 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+h) - f(1-3\tan h)}{h}$ 等于

(A) 5.

(B) 3.

(C) 4.

(D) 7.



本题有视频讲解哟, 答案册扫码。

151

设函数 $g(x)$ 在 $x = a$ 点处连续, $f(x) = |x - a| g(x)$ 在 $x = a$ 点处可导, 则 $g(a)$ 满足

(A) $g(a) = a$.(B) $g(a) \neq a$.(C) $g(a) = 0$.(D) $g(a) \neq 0$.

微信公众号【顶尖考研】
(ID: djky66)

152

设 $f(x) = |x| \sin^2 x$, 则使 $f^{(n)}(0)$ 存在的最高阶数 $n =$

(A) 0.

(B) 1.

(C) 2.

(D) 3.



微信公众号: 顶尖考研
(ID: djky66)

153 设 $f(x)$ 在点 $x=a$ 处可导, 则函数 $|f(x)|$ 在点 $x=a$ 处不可导的充分必要条件是

- (A) $f(a) = 0$, 且 $f'(a) = 0$. (B) $f(a) = 0$, 且 $f'(a) \neq 0$.
(C) $f(a) > 0$, 且 $f'(a) > 0$. (D) $f(a) < 0$, 且 $f'(a) < 0$.



154 设 $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f'(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} f'(x) = a$, 则

- (A) $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处必可导且 $f'(x_0) = a$.
(B) $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处必连续, 但未必可导.
(C) $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处必有极限但未必连续.
(D) 以上结论都不对.



155 设 $f(x)$ 为连续函数, $g(x) = \int_{-x}^0 t f(x+t) dt$, 则 $g'(x) =$

- (A) $-\int_0^x f(u) du$. (B) $\int_0^x f(u) du$.
(C) $-\int_0^{-x} f(u) du$. (D) $\int_0^{-x} f(u) du$.



156 设常数 $a > 1$, $y = x$ 为曲线 $y = a^x$ 的切线, 则

(A) $a = e$, 切点为 (e, e) .

(B) $a = e^{\frac{1}{e}}$, 切点为 (e, e) .

(C) $a = e$, 切点为 $(e^{\frac{1}{e}}, e^{\frac{1}{e}})$.

(D) $a = e^{\frac{1}{e}}$, 切点为 $(e^{\frac{1}{e}}, e^{\frac{1}{e}})$.



157 设 $f(0) = 0$, $f'(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 为严格单调增函数, 则函数 $g(x) = \frac{1-f(x)}{x}$ 在 $(0, +\infty)$

(A) 有界函数.

(B) 无界函数.

(C) 单调增函数.

(D) 单调减函数.



微信公众号【顶尖考研】
(ID: djky66)

158 设 $f(x)$ 在 x_0 可导, 且 $f'(x_0) > 0$, 则 $\exists \delta > 0$, 使得

(A) $f(x)$ 在 $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ 单调上升.

(B) $f(x) > f(x_0)$, $x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$, $x \neq x_0$.

(C) $f(x) > f(x_0)$, $x \in (x_0, x_0 + \delta)$.

(D) $f(x) < f(x_0)$, $x \in (x_0, x_0 + \delta)$.



159 设 $f(x)$ 对一切 $x \in (-\infty, +\infty)$ 满足方程 $(x-1)f''(x) + 2(x-1)[f'(x)]^3 = 1 - e^{1-x}$, 且 $f(x)$ 在 $x = a (a \neq 1)$ 处 $f'(a) = 0$, 则 $x = a$

- (A) 是 $f(x)$ 的极小值点. (B) 是 $f(x)$ 的极大值点.
(C) 不是 $f(x)$ 的极值点. (D) 是 $f(x)$ 的拐点.



160 设 $f(x)$ 具有二阶连续导数, 且 $f'(1) = 0, \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f''(x)}{(x-1)^2} = \frac{1}{2}$, 则

- (A) $f(1)$ 是 $f(x)$ 的极大值.
(B) $f(1)$ 是 $f(x)$ 的极小值.
(C) $(1, f(1))$ 是曲线 $f(x)$ 的拐点坐标.
(D) $f(1)$ 不是 $f(x)$ 的极值, $(1, f(1))$ 也不是曲线 $f(x)$ 的拐点坐标.



161 设 $f(x) = \begin{cases} 2 - \cos x, & x \leq 0 \\ \sqrt{x} + 1, & x > 0 \end{cases}$, 则

- (A) $x = 0$ 是 $f(x)$ 的极值点, 但 $(0, 1)$ 不是曲线 $y = f(x)$ 的拐点.
(B) $x = 0$ 不是 $f(x)$ 的极值点, 但 $(0, 1)$ 是曲线 $y = f(x)$ 的拐点.
(C) $x = 0$ 是 $f(x)$ 的极值点, 且 $(0, 1)$ 是曲线 $y = f(x)$ 的拐点.
(D) $x = 0$ 不是 $f(x)$ 的极值点, $(0, 1)$ 也不是曲线 $y = f(x)$ 的拐点.



162 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上有定义, 则下述命题中正确的是

- (A) 若 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上可导且单调增加, 则对一切 $x \in (-\infty, +\infty)$, 都有 $f'(x) > 0$.
 (B) 若 $f(x)$ 在点 x_0 处取得极值, 则 $f'(x_0) = 0$.
 (C) 若 $f''(x_0) = 0$, 则 $(x_0, f(x_0))$ 是曲线 $y = f(x)$ 的拐点坐标.
 (D) 若 $f'(x_0) = 0, f''(x_0) = 0, f'''(x_0) \neq 0$, 则 x_0 一定不是 $f(x)$ 的极值点.

答题
区域

纠错
笔记

163 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 可导, $f(a) = \max_{[a, b]} f(x)$, 则

- (A) $f'_+(a) = 0$. (B) $f'_+(a) \geq 0$.
 (C) $f'_+(a) < 0$. (D) $f'_+(a) \leq 0$.

答题
区域

纠错
笔记

164 数列 $1, \sqrt{2}, \sqrt[3]{3}, \dots, \sqrt[n]{n}, \dots$ 的最大项为

- (A) $\sqrt{2}$. (B) $\sqrt[3]{3}$. (C) $\sqrt[4]{4}$. (D) $\sqrt[5]{5}$.

答题
区域

纠错
笔记

微信公众号: 顶尖考研
(ID: djky66)

165 设 $f(x) = ax^3 - 6ax^2 + b$ 在区间 $[-1, 2]$ 上的最大值是 3, 最小值是 -29, 且 $a > 0$, 则

- (A) $a = 2, b = -29$. (B) $a = 3, b = 2$.
(C) $a = 2, b = 3$. (D) 以上都不对.



166 曲线 $\begin{cases} x = a(t - \sin t), \\ y = a(1 - \cos t), \end{cases} (a > 0)$ 在参数 $t = \frac{\pi}{2}$ 对应的点处的曲率为

- (A) $\frac{2\sqrt{2}}{a}$. (B) $\frac{\sqrt{2}}{a}$. (C) $\frac{1}{\sqrt{2}a}$. (D) $\frac{1}{2\sqrt{2}a}$.



微信公众号【顶尖考研】
(ID: djky66)

167 以下四个命题中, 正确的是

- (A) 若 $f'(x)$ 在 (a, b) 内连续, 则 $f(x)$ 在 (a, b) 内有界.
(B) 若 $f(x)$ 在 (a, b) 内连续, 则 $f(x)$ 在 (a, b) 内有界.
(C) 若 $f'(x)$ 在 (a, b) 内有界, 则 $f(x)$ 在 (a, b) 内有界.
(D) 若 $f(x)$ 在 (a, b) 内有界, 则 $f'(x)$ 在 (a, b) 内有界.



168

设 $f(x)$ 在 $(a, +\infty)$ 可导, 则 $f'(x)$ 在 $(a, +\infty)$ 有界是 $f(x)$ 在 $(a, +\infty)$ 有界的

- (A) 必要非充分条件. (B) 充分非必要条件.
(C) 充分且必要条件. (D) 既非充分也非必要条件.




169

函数 $y = f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 连续, 其二阶导函数的图形

如图所示, 则 $y = f(x)$ 的拐点的个数是


- (A) 1.
(B) 2.
(C) 3.
(D) 4.



微信公众号【顶尖考研】
(ID: djky66)

170

设 $[0, +\infty)$ 区间上 $y = f(x)$ 的导函数的图形如下图所示,



则 $y = f(x)$ 的拐点的个数是

- (A) 1. (B) 2. (C) 3. (D) 4.



171 设曲线 $y = \sqrt[3]{x-4}$, 则

- (A) 曲线的凸区间为 $(-\infty, 4)$, 凹区间为 $(4, +\infty)$, 拐点为 $(4, 0)$.
- (B) 曲线的凹区间为 $(-\infty, 4)$, 凸区间为 $(4, +\infty)$, 拐点为 $(4, 0)$.
- (C) 曲线的凸区间为 $(-\infty, 4)$, 凹区间为 $(4, +\infty)$, 无拐点.
- (D) 曲线的凹区间为 $(-\infty, 4)$, 凸区间为 $(4, +\infty)$, 无拐点.



172 函数 $f(x) = 3\arccos x - \arccos(3x - 4x^3)$ 在 $[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$

- (A) 单调上升.
- (B) 单调下降.
- (C) 为常数.
- (D) 有两个单调性区间.



173 设 $f(x)$ 在 $(1-\delta, 1+\delta)$ 内存在导数, $f'(x)$ 单调减少, 且 $f(1) = f'(1) = 1$, 则

- (A) 在 $(1-\delta, 1)$ 和 $(1, 1+\delta)$ 内均有 $f(x) < x$.
- (B) 在 $(1-\delta, 1)$ 和 $(1, 1+\delta)$ 内均有 $f(x) > x$.
- (C) 在 $(1-\delta, 1)$ 内有 $f(x) < x$, 在 $(1, 1+\delta)$ 内有 $f(x) > x$.
- (D) 在 $(1-\delta, 1)$ 内有 $f(x) > x$, 在 $(1, 1+\delta)$ 内有 $f(x) < x$.



174

$$\text{曲线 } y = \frac{x^2 + 1}{\sqrt{x^2 - 1}}$$

- (A) 既有垂直又有水平与斜渐近线. (B) 仅有垂直渐近线.
(C) 只有垂直与水平渐近线. (D) 只有垂直与斜渐近线.



175

函数 $f(x) = \cos x + x \sin x$ 在 $(-2\pi, 2\pi)$ 内的零点个数为

- (A) 1 个. (B) 2 个. (C) 3 个. (D) 4 个.



微信公众号【顶尖考研】
(ID: djky66)

176

设 $F(x)$ 是 $f(x)$ 在 (a, b) 内的一个原函数, 则 $f(x) + F(x)$ 在 (a, b) 内

- (A) 可导. (B) 连续.
(C) 存在原函数. (D) 是初等函数.



微信公众号: 顶尖考研
(ID: djky66)

177

$$\text{设 } f(x) = \begin{cases} \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 1, & x = 0 \end{cases}, F(x) = \int_{-1}^x f(t) dt, \text{ 则 } F(x)$$

- (A) 在 $(-1, 1)$ 为无界函数. (B) 在 $(-1, 1)$ 为连续有界函数.
(C) 在 $(-1, 1)$ 有间断点 $x = 0$. (D) 在 $[-1, 1]$ 不可积.



178

设 $f(x)$ 一阶可导, $f(x) > 0, f'(x) > 0$, 则当 $\Delta x > 0$ 时

- (A) $\int_x^{x+\Delta x} f(t) dt > f(x)\Delta x > 0$. (B) $\int_x^{x+\Delta x} f(t) dt < f(x)\Delta x < 0$.
(C) $f(x)\Delta x > \int_x^{x+\Delta x} f(t) dt > 0$. (D) $f(x)\Delta x < \int_x^{x+\Delta x} f(t) dt < 0$.



微信公众号【顶尖考研】
(ID: djky66)

179

考察下列叙述:

- ① 设 $f^2(x)$ 在 $x = x_0$ 连续, 则 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 连续.
② 设 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 连续, 则 $|f(x)|$ 在 $x = x_0$ 连续.
③ 设 $|f(x)|$ 在 $[a, b]$ 可积, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 可积.
④ 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 有界, 只有有限个间断点, 则 $|f(x)|$ 在 $[a, b]$ 可积, 即在 $[a, b]$ 存在定积分.

我们可知

- (A) 只有 ①, ② 正确. (B) 只有 ②, ③ 正确.
(C) 只有 ②, ④ 正确. (D) 只有 ③, ④ 正确.



顶尖考研公众号
(ID: djky66)

180

下列函数在指定区间上不存在定积分的是

$$(A) f(x) = \begin{cases} \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 1, & x = 0 \end{cases}, x \in [-1, 1].$$

$$(B) f(x) = \operatorname{sgn} x = \begin{cases} 1, & x > 0 \\ 0, & x = 0 \\ -1, & x < 0 \end{cases}, x \in [a, b].$$

$$(C) f(x) = \begin{cases} \tan x, & x \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}) \\ 0, & x = \pm \frac{\pi}{2} \end{cases}, x \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}].$$

$$(D) f(x) = \begin{cases} \frac{\sin x}{x}, & x \neq 0 \\ 1, & x = 0 \end{cases}, x \in [-1, 1].$$

答题
区域纠错
笔记

微信公众号【顶尖考研】
(ID: djky66)

181

下列命题中有一个正确的是

(A) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 可积, $f(x) \geq 0$, $\neq 0$, 则 $\int_a^b f(x) dx > 0$.

(B) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 可积, $g(x)$ 在 $[a, b]$ 不可积, 则 $f(x) + g(x)$ 在 $[a, b]$ 不可积.

(C) 设 $f^2(x)$ 在 $[a, b]$ 可积, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 可积.

(D) 设 $x_0 \in (a, b)$, $f(x)$ 在 $[a, b] \setminus \{x_0\}$ 连续且有界, $x = x_0$ 是 $f(x)$ 的间断点, 则 $F(x) = \int_a^x f(t) dt$ 在 $x = x_0$ 不可导.

答题
区域纠错
笔记

182 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 连续, 则下列结论中正确的个数为

① $f(x)$ 在 $[a, b]$ 的任意子区间 $[\alpha, \beta]$ 上 $\int_{\alpha}^{\beta} f(x) dx = 0$, 则 $f(x) = 0 (\forall x \in [a, b])$.

② $f(x) \geq 0 (x \in [a, b])$, 又 $\int_a^b f(x) dx = 0$, 则 $f(x) = 0 (x \in [a, b])$.

③ $[\alpha, \beta] \subset [a, b]$, 则 $\int_a^b f(x) dx \geq \int_{\alpha}^{\beta} f(x) dx$.

(A) 0.

(B) 1.

(C) 2.

(D) 3.



183 下述结论不正确的是

(A) $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\tan x}{x} dx < 1$.

(B) $\int_0^{2\pi} \cos x \cdot \ln(2 + \cos x) dx > 0$.

(C) $\int_0^{2\pi} \frac{\sin x}{x} dx < 0$.

(D) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{x} dx > 1$.



184 设 $I = \int_1^2 \frac{dx}{(1+x)\sqrt[3]{x}}$, $J = \int_1^2 \frac{dx}{(1+x^2)\sqrt[3]{x}}$, $K = \int_1^2 \frac{dx}{(1+x^2)\sqrt{x}}$, 则 I, J, K 三个数的大小关系是:

(A) $I < J < K$.

(B) $J < K < I$.

(C) $K < J < I$.

(D) $I < K < J$.



185

设常数 $\alpha > 0$, $I_1 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{1+x^\alpha} dx$, $I_2 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{1+x^\alpha} dx$, 则

(A) $I_1 > I_2$.

(B) $I_2 > I_1$.

(C) $I_1 = I_2$.

(D) I_1 与 I_2 谁大谁小与 α 有关.

186

下列用牛顿-莱布尼茨公式计算定积分的做法中,错误的做法一共有

① $\int_0^\pi \sqrt{\sin^3 x - \sin^5 x} dx = \int_0^\pi \sin^{\frac{3}{2}} x \cos x dx = \frac{2}{5} \sin^{\frac{5}{2}} x \Big|_0^\pi = 0$.

② $\int_{-1}^1 \frac{dx}{x} = \ln |x| \Big|_{-1}^1 = 0$.

③ $\int_0^\pi \frac{\sec^2 x}{2 + \tan^2 x} dx = \frac{1}{\sqrt{2}} \arctan \frac{\tan x}{\sqrt{2}} \Big|_0^\pi = 0$.

④ $\int_{-1}^1 \frac{d}{dx} \left(\arctan \frac{1}{x} \right) dx = \arctan \frac{1}{x} \Big|_{-1}^1 = \frac{\pi}{2}$.

(A) 1 个.

(B) 2 个.

(C) 3 个.

(D) 4 个.



187

$$I = \int_0^\pi x \sqrt{\cos^2 x - \cos^4 x} dx =$$

(A) π .

(B) $\frac{\pi}{2}$.

(C) $\frac{\pi}{3}$.

(D) $\frac{\pi}{4}$.



微信公众号:顶尖考研
(ID: djky66)

188 $I = \int_0^1 \frac{x}{\sqrt{x(1-x)}} dx =$

(A) π .

(B) $\frac{\pi}{2}$.

(C) $\frac{\pi}{4}$.

(D) $\frac{\pi}{8}$.



189 $I = \int_0^1 x^4 \sqrt{\frac{1+x}{1-x}} dx =$

(A) $\frac{3}{8} + \frac{8}{15}\pi$.

(B) $\frac{3}{16}\pi + \frac{8}{15}$.

(C) $\frac{3}{16} + \frac{8}{15}\pi$.

(D) $\frac{3}{16}\pi + \frac{8}{5}\pi$.



微信公众号【顶尖考研】
(ID: djky66)


190 设 n, m 为非负整数, $I_{n,m} = \int_0^1 x^n \ln^m x dx$ 是

(A) 定积分且值为 $\frac{(-1)^n n!}{(n+1)^m}$.

(B) 定积分且值为 $\frac{(-1)^m m!}{(n+1)^{m+1}}$.

(C) 反常积分且发散.

(D) 反常积分且值为 $\frac{(-1)^m m!}{(n+1)^{m+1}}$.



191

设 $\sin x \ln |x|$ 是 $f(x)$ 的一个原函数, 则不定积分 $\int x f'(x) dx =$

(A) $x \cos x \ln |x| + x \cdot \frac{\sin x}{|x|} - \sin x \ln |x| + C.$

(B) $x \cos x \ln |x| + \sin x - \sin x \ln |x| + C.$

(C) $\cos x \ln |x| - \frac{\sin x}{|x|} - \sin x \ln |x| + C.$

(D) 以上均不正确.



192

$$\frac{d}{dx} \int_{2x}^{\ln x} \ln(1+t) dt =$$

(A) $\frac{1}{x} \ln(1 + \ln x) - 2 \ln(1 + 2x).$

(B) $\frac{1}{x} \ln(1 + \ln x) - \ln(1 + 2x).$

(C) $\ln(1 + \ln x) - \ln(1 + 2x).$

(D) $\ln(1 + \ln x) - 2 \ln(1 + 2x).$



193

设 $F(x) = \int_0^x \left(\int_0^{t^2} \ln(1+t^2) dt \right) du$, 则曲线 $y = F(x)$

(A) 在 $(-\infty, 0)$ 是凹的, 在 $(0, +\infty)$ 是凸的.

(B) 在 $(-\infty, 0)$ 是凸的, 在 $(0, +\infty)$ 是凹的.

(C) 在 $(-\infty, +\infty)$ 是凹的.

(D) 在 $(-\infty, +\infty)$ 是凸的.



194

$$\text{设 } f(x) = \begin{cases} \sqrt{4+x}, & x > 0 \\ 0, & x = 0 \\ \sqrt{1-x}, & x < 0 \end{cases}, \quad F(x) = \int_0^x f(t) dt, \text{ 则}$$

- (A) $F(x)$ 在 $x=0$ 点不连续.
 (B) $F(x)$ 在 $x=0$ 点不可导.
 (C) $F(x)$ 在 $x=0$ 点可导, $F'(0) = f(0)$.
 (D) $F(x)$ 在 $x=0$ 点可导, 但 $F'(0) \neq f(0)$.



答案
区域



纠错
笔记

195

下列叙述错误的是

- (A) 设 $f(x)$ 在 $[-a, a]$ 连续为奇函数, 则 $f(x)$ 在 $[-a, a]$ 的全体原函数为偶函数.
 (B) 设 $f(x)$ 在 $[-a, a]$ 连续为偶函数, 则 $f(x)$ 在 $[-a, a]$ 的全体原函数为奇函数.
 (C) 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 连续, 以 T 为周期且为奇函数, 则 $\int_0^x f(x) dt$ 也是以 T 为周期的函数.
 (D) 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 连续, 以 T 为周期, 又 $\int_0^{+\infty} f(x) dx$ 收敛, 则 $\int_0^x f(t) dt$ 也是以 T 为周期的函数.



答案
区域



纠错
笔记

196

设 $f(x)$ 为以 T 为周期的非零连续函数, $\Phi(x) = \int_a^x [f(t) - f(-t)]dt$, a 是常数, 则

- (A) $\Phi(x)$ 是以 T 为周期的偶函数.
 (B) $\Phi(x)$ 是以 T 为周期的奇函数.
 (C) $\Phi(x)$ 是偶函数, 但不一定以 T 为周期.
 (D) $\Phi(x)$ 是奇函数, 但不一定以 T 为周期.

 答题
区域

 纠错
笔记

197

函数 $F(x) = \int_x^{x+\pi} \ln(1 + \cos^2 t) \cos 2t dt$

- (A) 为正数. (B) 为负数. (C) 恒为零. (D) 不是常数.

 答题
区域

 纠错
笔记

198

设 $f(x)$ 为连续函数, $\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x \cos x) \cos x dx = A$, 则 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x \cos x) x \sin x dx =$

- (A) 0. (B) A . (C) $-A$. (D) $2A$.

 答题
区域

 纠错
笔记

微信公众号: 顶尖考研
(ID: djky66)

199

设 $f(x) = \begin{cases} x^2, & x \geq 0 \\ \cos x, & x < 0 \end{cases}$, $g(x) = \begin{cases} x \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$, 则在区间 $(-1, 1)$ 内

- (A) $f(x)$ 与 $g(x)$ 都存在原函数.
 (B) $f(x)$ 与 $g(x)$ 都不存在原函数.
 (C) $f(x)$ 存在原函数, $g(x)$ 不存在原函数.
 (D) $f(x)$ 不存在原函数, $g(x)$ 存在原函数.



200

数列极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{\sqrt{n^2+4}} + \frac{1}{\sqrt{n^2+16}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n^2+4n^2}} \right) =$

- (A) $\frac{1}{2} \ln(\sqrt{5}-2)$. (B) $\frac{1}{2} \ln(\sqrt{6}-2)$.
 (C) $\frac{1}{2} \ln(\sqrt{5}+2)$. (D) $\frac{1}{2} \ln(\sqrt{6}+2)$.



201

数列极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\int_0^{n\pi} |\sin x| dx}{(n+1)\pi} =$

- (A) 0. (B) 不存在. (C) $\frac{2}{\pi}$. (D) $\frac{1}{\pi}$.



202 下列反常积分发散的是

(A) $\int_{-1}^1 \frac{1}{\sin x} dx$. (B) $\int_{-1}^1 \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx$. (C) $\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx$. (D) $\int_2^{+\infty} \frac{1}{x \ln^2 x} dx$.

 答案
区域

 纠错
笔记

203 下列反常积分收敛的是

(A) $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{\sqrt{x^2-1}}$. (B) $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{\sqrt{x(x-1)}}$.
(C) $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^2 \sqrt{x^2-1}}$. (D) $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x(x^2-1)}$.

 答案
区域

 纠错
笔记

微信公众号【顶尖考研】
(ID: djky66)

204 设有下列命题

- ① 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 连续是奇函数, 则 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 0$.
 ② 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 连续, 又 $\lim_{R \rightarrow +\infty} \int_{-R}^R f(x) dx$ 存在, 则 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx$ 收敛.
 ③ $\int_a^{+\infty} f(x) dx, \int_a^{+\infty} g(x) dx$ 均发散, 则 $\int_a^{+\infty} [f(x) + g(x)] dx$ 可能发散, 也可能收敛.
 ④ 若 $\int_{-\infty}^0 f(x) dx$ 与 $\int_0^{+\infty} f(x) dx$ 均发散, 则不能确定 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx$ 是否收敛.

则以上命题中正确的个数是

- (A) 1. (B) 2. (C) 3. (D) 4.

 答案
区域

 纠错
笔记

微信公众号: 顶尖考研
(ID: djky66)


205 曲线 $y = \cos x (x \in [0, \frac{\pi}{2}])$ 与 x 轴, y 轴所围面积被曲线 $y = a \sin x$ 等分, 则 $a =$

- (A) $\frac{2}{5}$. (B) $\frac{3}{5}$. (C) $\frac{3}{4}$. (D) $\frac{1}{2}$.




206 由曲线 $y = 1 - (x-1)^2$ 及直线 $y = 0$ 围成图形绕 y 轴旋转而成立体的体积 V 是

- (A) $\int_0^1 \pi(1 + \sqrt{1+y})^2 dy$.
 (B) $\int_0^1 \pi(1 - \sqrt{1-y})^2 dy$.
 (C) $\int_0^1 \pi[(1 + \sqrt{1-y}) - (1 - \sqrt{1-y})]^2 dy$.
 (D) $\int_0^1 \pi[(1 + \sqrt{1-y})^2 - (1 - \sqrt{1-y})^2] dy$.



207 曲线 $r = ae^{b\theta} (a > 0, b > 0)$ 从 $\theta = 0$ 到 $\theta = \alpha (\alpha > 0)$ 的一段弧长为

- (A) $s = \int_0^\alpha ae^{b\theta} \sqrt{1+b^2} d\theta$. (B) $s = \int_0^\alpha \sqrt{1+(abe^{b\theta})^2} d\theta$.
 (C) $s = \int_0^\alpha \sqrt{1+(ae^{b\theta})^2} d\theta$. (D) $s = \int_0^\alpha abe^{b\theta} \sqrt{1+(abe^{b\theta})^2} d\theta$.



208 旋轮线的一支 $x = a(t - \sin t), y = a(1 - \cos t) (0 \leq t \leq 2\pi)$ 的质心是

- (A) $\left(\pi a, \frac{4}{3}a\right)$. (B) $\left(\pi a, \frac{2}{3}a\right)$. (C) $\left(\pi a, \frac{5}{4}a\right)$. (D) $\left(\pi a, \frac{7}{4}a\right)$.



209 峰值为 V_m , 周期为 T 的三角形波的电压平均值为

- (A) $\frac{V_m}{2}$. (B) $\frac{V_m}{\sqrt{3}}$. (C) $\frac{V_m}{4}$. (D) $\frac{V_m}{\sqrt{2}}$.



微信公众号【顶尖考研】
(ID: djky66)

210 半圆形闸门半径为 R (米), 将其垂直放入水中, 且直径与水面齐. 设 $\rho g = 1$. 若坐标原点取在圆心, x 轴正向朝下, 则闸门所受压力 p 为

- (A) $\int_0^R \sqrt{R^2 - x^2} dx$. (B) $\int_0^R 2 \sqrt{R^2 - x^2} dx$.
(C) $\int_0^R 2x \sqrt{R^2 - x^2} dx$. (D) $\int_0^R 2(R - x) \sqrt{R^2 - x^2} dx$.



微信公众号: 顶尖考研
(ID: djky66)

211 已知 $y_1(x)$ 和 $y_2(x)$ 是方程 $y' + p(x)y = 0$ 的两个不同的特解, 则该方程的通解为

- (A) $y = Cy_1(x)$. (B) $y = Cy_2(x)$.
(C) $y = C_1y_1(x) + C_2y_2(x)$. (D) $y = C(y_1(x) - y_2(x))$.

答题
区域

纠错
笔记

212 设 $P(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 连续, 且以 T 为周期, 则 $\int_0^T P(x)dx = 0$ 是方程

$$\frac{dy}{dx} + P(x)y = 0$$

有解 $y = y(x) \not\equiv 0$ 且以 T 为周期的

- (A) 必要非充分条件. (B) 充分非必要条件.
(C) 充分且必要条件. (D) 既不充分也不必要条件.

答题
区域

纠错
笔记

213 设 $y = y(x)$ 是 $y'' + by' + cy = 0$ 的解, 其中 b, c 为正的常数, 则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} y(x)$

- (A) 与解 $y(x)$ 的初值 $y(0), y'(0)$ 有关, 与 b, c 无关.
(B) 与解 $y(x)$ 的初值 $y(0), y'(0)$ 及 b, c 均无关.
(C) 与解 $y(x)$ 的初值 $y(0), y'(0)$ 及 c 无关, 只与 b 有关.
(D) 与解 $y(x)$ 的初值 $y(0), y'(0)$ 及 b 无关, 只与 c 有关.

答题
区域

纠错
笔记

214 已知 $y^* = e^{-2x} + (x^2 + 2)e^x$ 是二阶常系数线性非齐次微分方程 $y'' + ay' + by = (cx + d)e^x$ 的一个解, 则方程中的系数 a 与 b 以及非齐次项中的常数 c 和 d 分别是

- (A) $a = 1, b = -2, c = 6, d = 2$.
 (B) $a = 1, b = 2, c = 6, d = -2$.
 (C) $a = 1, b = -2, c = -6, d = 2$.
 (D) $a = 1, b = -2, c = 6, d = -2$.



215 设 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 连续, 在 $(0, +\infty)$ 有连续导数且

$$x \int_0^1 f(tx) dt + 2 \int_0^x f(t) dt = xf(x) + x^3$$


则可得

- (A) $f(x) = Cx^2 - 3x^2 \ln(1+x) (x \in [0, +\infty)), (C \text{ 为任意常数})$.
 (B) $f(x) = x^2 - 3x^2 \ln(1+x) (x \in [0, +\infty))$.
 (C) $f(x) = \begin{cases} Cx^2 - 3x^2 \ln x, & x > 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}, (C \text{ 为任意常数})$.
 (D) $f(x) = \begin{cases} x^2 - 3x^2 \ln x, & x > 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$.



216 设 L 是连接两点 $A(0,1)$ 与 $B(1,0)$ 的一条凸弧, $P(x, y)$ 是 L 上的任意一点. 已知凸弧 L 与弦 AP 围成的平面图形的面积等于 x^4 , 则 L 的方程是

- (A) $1-3x+4x^3$.
 (B) $1-4x+3x^3$.
 (C) $1+3x-4x^3$.
 (D) $1+4x-3x^3$.



答题
区域

纠错
笔记

217 设 a, b, c 为待定常数, 则微分方程 $y'' - 3y' + 2y = 3x - 2e^x$ 的特解具有形式

- (A) $(ax+b)e^x$.
 (B) $(ax+b)xe^x$.
 (C) $(ax+b) + ce^x$.
 (D) $(ax+b) + cxe^x$.

答题
区域

纠错
笔记

(ID: djky66)

218 已知曲线 $y = y(x)$ 经过原点, 且在原点的切线平行于直线 $2x - y - 5 = 0$, 而 $y(x)$ 满足微分方程 $y'' - 6y' + 9y = e^{3x}$, 则此曲线的方程为

- (A) $y = \sin 2x$.
 (B) $y = \frac{1}{2}x^2 e^{2x} + \sin 2x$.
 (C) $y = \frac{x}{2}(x+4)e^{3x}$.
 (D) $y = (x^2 \cos x + \sin 2x)e^{3x}$.

答题
区域

纠错
笔记

219 设 $f_1(x), f_2(x)$ 为二阶常系数线性微分方程 $y'' + py' + qy = 0$ 的两个特解, C_1, C_2 是两个任意常数, 则 $C_1 f_1(x) + C_2 f_2(x)$ 是该方程通解的充分条件是

- (A) $f_1(x)f_2'(x) - f_2(x)f_1'(x) = 0$.
 (B) $f_1(x)f_2'(x) + f_2(x)f_1'(x) = 0$.
 (C) $f_1(x)f_2'(x) + f_2(x)f_1'(x) \neq 0$.
 (D) $f_1(x)f_2'(x) - f_2(x)f_1'(x) \neq 0$.

答案
区域

纠错
笔记

220 若 A, B 为非零常数, C_1, C_2 为任意常数, 则微分方程 $y'' + k^2 y = \cos x$ 的通解可能具有形式

- (A) $C_1 \cos kx + C_2 \sin kx + A \sin x + B \cos x$.
 (B) $C_1 \cos kx + C_2 \sin kx + Ax \cos x$.
 (C) $C_1 \cos kx + C_2 \sin kx + Ax \sin x$.
 (D) $C_1 \cos kx + C_2 \sin kx + Ax \sin x + Bx \cos x$.

答案
区域

纠错
笔记

221 设 A, B 都是不等于零的常数, 则微分方程 $y'' - 2y' + 5y = e^x \cos 2x$ 有特解

- (A) $y^* = xe^x(A \cos 2x + B \sin 2x)$. (B) $y^* = e^x(A \cos 2x + B \sin 2x)$.
 (C) $y^* = Ax e^x \cos 2x$. (D) $y^* = Ax e^x \sin 2x$.

答案
区域

纠错
笔记

微信公众号: 顶尖考研
(ID: djky66)

222 具有特解 $y_1 = e^{-x}, y_2 = 2xe^{-x}, y_3 = 3e^x$ 的三阶常系数齐次线性微分方程是

(A) $y''' - y'' - y' + y = 0.$

(B) $y''' + y'' - y' - y = 0.$

(C) $y''' - 6y'' + 11y' - 6y = 0.$

(D) $y''' - 2y'' - y' + 2y = 0.$



223 微分方程 $\frac{dy}{dx} + xy = \frac{x}{2y}e^{-x^2}$ 满足 $y(0) = 1$ 的特解是

(A) $y = (x^2 + 1)e^{-\frac{x^2}{2}}.$

(B) $y = \sqrt{\frac{1}{2}x^2 + 1} e^{-\frac{1}{2}x^2}.$

(C) $y = \left(\frac{1}{2}x^2 + 1\right)e^{-\frac{x^2}{2}}.$

(D) $y = \sqrt{\frac{1}{2}x^2 + 1} e^{-x^2}.$



224 微分方程 $(y^2 - 1)dx + (2xy - \cos y)dy = 0$ 的通解是

(A) $y^2x - \sin y = C.$

(B) $y^2x - \cos y = C.$

(C) $(y^2 - 1)x - \cos y = C.$

(D) $(y^2 - 1)x - \sin y = C.$

其中 C 为任意常数.



225 方程 $x^2 y'' + 2xy' - 2y = 0$ 的通解为

(A) $y = C_1 e^x + C_2 e^{2x}$.

(B) $y = (C_1 + C_2 x) e^x$.

(C) $y = C_1 x + C_2 x^2$.

(D) $y = \frac{C_1}{x^2} + C_2 x$.



226

设二元函数 $f(x, y) = \frac{\sin(x^2 y + y^4)}{x^2 + y^2}$, 则 $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} f(x, y) =$

(A) 1.

(B) 0.

(C) $+\infty$.

(D) 不存在, 也不为 ∞ .



微信公众号【顶尖考研】
(ID: djky66)

227

设 k 为常数, 则极限 $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{xy^2 \sin ky}{x^2 + y^4}$

(A) 等于 0.

(B) 等于 $\frac{1}{2}$.

(C) 不存在.

(D) 存在与否与 k 取值有关.



228

极限 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{2x^2y}{x^4+y^2}$

(A) 不存在.

(B) 等于 2.

(C) 等于 $\frac{1}{2}$.

(D) 等于 0.



229

极限 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} xy \ln(x^2+y^2)$

(A) 不存在.

(B) 等于 1.

(C) 等于 0.

(D) 等于 2.



微信公众号【顶尖考研】
(ID: djky66)

230

设 $f(x,y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2+y^2}, & (x,y) \neq (0,0) \\ 0, & (x,y) = (0,0) \end{cases}$, 则 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处

(A) 连续、偏导数存在.

(B) 连续、偏导数不存在.

(C) 不连续、偏导数存在.

(D) 不连续、偏导数不存在.



231

设 $f(x,y) = \begin{cases} \frac{x^2 y}{x^2 + y^2}, & (x,y) \neq (0,0) \\ 0, & (x,y) = (0,0) \end{cases}$, 则 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处

- (A) 不连续. (B) 连续但偏导数不存在.
(C) 连续且偏导数存在但不可微. (D) 可微.



232

设 $f(x,y) = \begin{cases} \frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}}, & (x,y) \neq (0,0) \\ 0, & (x,y) = (0,0) \end{cases}$, 则 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处

- (A) 两个偏导数都不存在. (B) 两个偏导数都存在但不可微.
(C) 偏导数连续. (D) 可微但偏导数不连续.



微信公众号【顶尖考研】
(ID: djky66)

233

设 $f(x,y) = \begin{cases} xy \sin \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}, & x^2 + y^2 \neq 0 \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$, 则 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处

- (A) 不连续.
(B) 连续, 但偏导数 $f'_x(0,0)$ 和 $f'_y(0,0)$ 不存在.
(C) 连续且偏导数 $f'_x(0,0)$ 和 $f'_y(0,0)$ 都存在, 但不可微.
(D) 全微分存在但一阶偏导函数 f'_x 和 f'_y 不连续.



微信公众号: 顶尖考研
(ID: djky66)

234

设 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^4 - y^4}{x^2 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0 \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$, 则 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处

- (A) 连续, 但偏导数 $f'_x(0, 0)$ 和 $f'_y(0, 0)$ 不存在.
 (B) 连续且偏导数 $f'_x(0, 0)$ 和 $f'_y(0, 0)$ 都存在, 但不可微.
 (C) 可微但 f'_x 和 f'_y 不连续.
 (D) 可微且 f'_x 和 f'_y 连续.



答案
区域



纠错
笔记

235

设 $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{f(x, y) - f(0, 0) + 2x - y}{\sqrt{x^2 + y^2}} = 1$, 则 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处

- (A) 不连续.
 (B) 连续但两个偏导数不存在.
 (C) 两个偏导数存在但不可微.
 (D) 可微.



答案
区域



纠错
笔记

(ID: djky66)

236

设 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 连续, 且 $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{f(x, y) - 1}{x^2 + y^2} = 2$, 则 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处

- (A) 不存在偏导数.
 (B) 存在偏导数但不可微.
 (C) 可微且 $\frac{\partial f(0, 0)}{\partial x} \neq 0, \frac{\partial f(0, 0)}{\partial y} \neq 0$.
 (D) 可微且 $\frac{\partial f(0, 0)}{\partial x} = \frac{\partial f(0, 0)}{\partial y} = 0$.



答案
区域



纠错
笔记

形考尖页: 号众公計婚
(ID: qkky66)

237

函数 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 点可微的充分条件是

- (A) $\lim_{x \rightarrow 0} f'_x(x, 0) = f'_x(0, 0)$ 且 $\lim_{y \rightarrow 0} f'_y(0, y) = f'_y(0, 0)$.
 (B) $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} [f(x, y) - f(0, 0)] = 0$.
 (C) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x, 0) - f(0, 0)}{x}$ 和 $\lim_{y \rightarrow 0} \frac{f(0, y) - f(0, 0)}{y}$ 都存在.
 (D) $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} f'_x(x, y) = f'_x(0, 0)$ 且 $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} f'_y(x, y) = f'_y(0, 0)$.

 答案
区域

 纠错
笔记

本题有视频讲解的, 答案册扫码.

238

如果 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处连续, 那么下列命题正确的是

- (A) 若极限 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{f(x, y)}{|x| + |y|}$ 存在, 则 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处可微.
 (B) 若极限 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{f(x, y)}{x^2 + y^2}$ 存在, 则 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处可微.
 (C) 若 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处可微, 则 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{f(x, y)}{|x| + |y|}$ 存在.
 (D) 若 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处可微, 则 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{f(x, y)}{x^2 + y^2}$ 存在.

 答案
区域

 纠错
笔记

239

二元函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处连续是函数 $z = f(x, y)$ 在该点处两个偏导数 $f'_x(x_0, y_0), f'_y(x_0, y_0)$ 都存在的

- (A) 必要但非充分条件. (B) 充分但非必要条件.
 (C) 充要条件. (D) 既非充分条件也非必要条件.

 答案
区域

 纠错
笔记

240 设 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处两个偏导数 $f'_x(x_0, y_0), f'_y(x_0, y_0)$ 都存在, 则

- (A) $f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 处连续.
- (B) $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} f(x, y)$ 存在.
- (C) $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x, y_0) = \lim_{y \rightarrow y_0} f(x_0, y) = f(x_0, y_0)$.
- (D) $f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 处可微.

 答题区域

 纠错笔记

241 函数 $f(x, y)$ 的两个偏导数在点 (x_0, y_0) 处连续是函数 $f(x, y)$ 在该点处可微的

- (A) 充分但非必要条件.
- (B) 必要但非充分条件.
- (C) 充分必要条件.
- (D) 既不充分也不必要条件.

 答题区域

 纠错笔记

242 设函数 $f(x, y)$ 可微, 且对任意 x, y 都有 $\frac{\partial f(x, y)}{\partial x} > 0, \frac{\partial f(x, y)}{\partial y} < 0$, 则使不等式 $f(x_1, y_1) < f(x_2, y_2)$ 成立的一个充分条件是

- (A) $x_1 > x_2, y_1 < y_2$.
- (B) $x_1 > x_2, y_1 > y_2$.
- (C) $x_1 < x_2, y_1 < y_2$.
- (D) $x_1 < x_2, y_1 > y_2$.

 答题区域

 纠错笔记

243 设可微函数 $f(x, y)$ 满足 $\frac{\partial f}{\partial x} > 1, \frac{\partial f}{\partial y} < -1, f(0, 0) = 0$, 则下列结论正确的是

- (A) $f(1, 1) > 1$. (B) $f(-1, 1) > -2$.
(C) $f(-1, -1) < 0$. (D) $f(1, -1) > 2$.

答题
区域

纠错
笔记

244 已知方程 $f\left(\frac{y}{x}, \frac{z}{x}\right) = 0$ 确定了函数 $z = z(x, y)$, $f(u, v)$ 可微, 则 $x \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y} =$

- (A) z . (B) $-z$. (C) y . (D) $-y$.

答题
区域

纠错
笔记

微信公众号【顶尖考研】
(ID: djky66)

245 已知 $\frac{(x+ay)dx + ydy}{(x+y)^2}$ 为某函数的全微分, 则 a 等于

- (A) 2. (B) 1. (C) 0. (D) -1.

答题
区域

纠错
笔记

微信公众号: 顶尖考研
(ID: djky66)

246 已知 $df(x, y) = (2y^2 + 2xy + 3x^2)dx + (4xy + x^2)dy$, 则 $f(x, y) =$

- (A) $2xy^2 + x^2y$. (B) $2xy^2 + x^2y + x^3$.
(C) $2xy^2 + x^2y + x^3 + C$. (D) $3xy^2 + x^2y + x^3 + C$.

答案区域

纠错笔记

247 设函数 $z = f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处连续, 且 $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{f(x, y)}{1 - \cos \sqrt{x^2 + y^2}} = -2$, 则

- (A) $f'_x(0, 0)$ 不存在. (B) $f'_x(0, 0)$ 存在但不为零.
(C) $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 点取极大值. (D) $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 点取极小值.

答案区域

纠错笔记


微信公众号【顶尖考研】
(ID: djky66)

248 下列命题正确的是

- (A) 若 (x_0, y_0) 为 $f(x, y)$ 的极值点, 则 (x_0, y_0) 必为 $f(x, y)$ 的驻点.
(B) 若 (x_0, y_0) 为 $f(x, y)$ 的驻点, 则 (x_0, y_0) 必为 $f(x, y)$ 的极值点.
(C) 若 (x_0, y_0) 为有界闭区域 D 上连续的函数 $f(x, y)$ 在 D 内部唯一的极值点, 且 $f(x, y)$ 在该点取极大值, 则 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 取得它在 D 上的最大值.
(D) 若 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 取得极小值, 则 $f(x, y)$ 在 $x = x_0$ 处取极小值, $f(x_0, y)$ 在 $y = y_0$ 处取极小值.

答案区域

纠错笔记



249

设 $F(x, y)$ 具有二阶连续偏导数, 且 $F(x_0, y_0) = 0, F'_x(x_0, y_0) = 0, F'_y(x_0, y_0) > 0$. 若一元函数 $y = y(x)$ 是由方程 $F(x, y) = 0$ 所确定的在点 (x_0, y_0) 附近的隐函数, 则 x_0 是函数 $y = y(x)$ 的极小值点的一个充分条件是

(A) $F''_{xx}(x_0, y_0) > 0$.

(B) $F''_{xx}(x_0, y_0) < 0$.

(C) $F''_{yy}(x_0, y_0) > 0$.

(D) $F''_{yy}(x_0, y_0) < 0$.



250

函数 $f(x, y) = kx^2 + y^3 - 3y$ 在点 $(0, 1)$ 处

(A) 取极大值.

(B) 取极小值.

(C) 不取得极值.

(D) 是否取得极值与 k 取值有关.

251

函数 $f(x, y) = 1 + x + y$ 在区域 $x^2 + y^2 \leq 1$ 上的最大值与最小值之积为

(A) -1 .

(B) 1 .

(C) $1 + \sqrt{2}$.

(D) $1 - \sqrt{2}$.



微信公众号: 顶尖考研
(ID: djky66)

252 函数 $f(x, y) = e^{-xy}$ 在区域 $D = \{(x, y) \mid 4x^2 + y^2 \leq 1\}$ 上的最大值是

- (A) e^2 . (B) e . (C) $e^{\frac{1}{4}}$. (D) $e^{\frac{1}{2}}$.




253 设 $f(x, y) = x^3 - 4x^2 + 2xy - y^2$, 区域 $D = \{(x, y) \mid -1 \leq x \leq 4, -1 \leq y \leq 1\}$, 则下面结论正确的是

- (A) 点 $(0, 0)$ 是 $f(x, y)$ 的极大值点且是 $f(x, y)$ 在区域 D 的最大值点.
 (B) 点 $(0, 0)$ 是 $f(x, y)$ 的极大值点但不是 $f(x, y)$ 在区域 D 的最大值点.
 (C) 点 $(0, 0)$ 是 $f(x, y)$ 的极小值点.
 (D) 点 $(0, 0)$ 是 $f(x, y)$ 的驻点, 但不是极值点.



254 已知函数 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 某邻域内连续, 且 $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{f(x, y) + 4x^2 - y^2}{x^4 + x^2y^2 + y^4} = 1$, 则

- (A) 点 $(0, 0)$ 不是 $f(x, y)$ 的极值点.
 (B) 点 $(0, 0)$ 是 $f(x, y)$ 的极大值点.
 (C) 点 $(0, 0)$ 是 $f(x, y)$ 的极小值点.
 (D) 所给条件不足以判断点 $(0, 0)$ 是否为 $f(x, y)$ 的极值点.



255

设有三个正数 x, y, z 满足 $x + y + z = a$, 其中 $a > 0$ 为常数, 又

$$xyz \leq b$$

则 b 的最小取值是

(A) $\frac{a^3}{21}$.

(B) $\frac{a^3}{18}$.

(C) $\frac{a^3}{9}$.

(D) $\frac{a^3}{27}$.



256

设 D 是 xOy 平面上以 $(1, 1)$, $(-1, 1)$ 和 $(-1, -1)$ 为顶点的三角形区域, D_1 是 D 在第一象限的部分, 则 $\iint_D (xy + \cos x \sin y) d\sigma$ 等于

(A) $2 \iint_{D_1} \cos x \sin y d\sigma$.

(B) $2 \iint_{D_1} xy d\sigma$.

(C) $4 \iint_{D_1} (xy + \cos x \sin y) d\sigma$.

(D) 0.



257

累次积分 $\int_0^1 dx \int_x^1 f(x, y) dy + \int_1^2 dy \int_0^{2-y} f(x, y) dx$ 可写成

(A) $\int_0^2 dx \int_x^{2-x} f(x, y) dy$.

(B) $\int_0^2 dy \int_y^{2-y} f(x, y) dx$.

(C) $\int_0^1 dx \int_x^{2-x} f(x, y) dy$.

(D) $\int_0^1 dy \int_y^{2-y} f(x, y) dx$.



258

设 $x = r\cos\theta, y = r\sin\theta$, 则在极坐标系 (r, θ) 中的累次积分 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_{\frac{1}{\cos\theta+\sin\theta}}^1 f(r\cos\theta, r\sin\theta) dr$ 可化为直角坐标系 (x, y) 中的累次积分

(A) $\int_0^1 dx \int_{1-x}^{\sqrt{1-x^2}} f(x, y) dy.$

(B) $\int_0^1 dx \int_{1-x}^{\sqrt{1-x^2}} \frac{f(x, y)}{\sqrt{x^2 + y^2}} dy.$

(C) $\int_0^1 dx \int_x^{\sqrt{1-x^2}} f(x, y) dy.$

(D) $\int_0^1 dx \int_x^{\sqrt{1-x^2}} \frac{f(x, y)}{\sqrt{x^2 + y^2}} dy.$



答案
区域



本题有视频讲解哟, 答案册扫码。

259

累次积分 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{2\sin\theta} f(r\cos\theta, r\sin\theta) r dr$ 可写成

(A) $\int_0^2 dx \int_0^{1+\sqrt{1-x^2}} f(x, y) dy.$

(B) $\int_0^2 dx \int_0^{\sqrt{2x-x^2}} f(x, y) dy.$

(C) $\int_0^2 dy \int_0^{\sqrt{2y-y^2}} f(x, y) dx.$

(D) $\int_0^2 dx \int_0^2 f(x, y) dy.$



答案
区域



纠错
笔记

260

累次积分 $I = \int_0^1 dx \int_{x^2}^1 \frac{xy}{\sqrt{1+y^3}} dy =$

(A) $\frac{1}{4}(\sqrt{2}-1).$

(B) $\frac{1}{3}(\sqrt{2}-1).$

(C) $\frac{1}{4}(\sqrt{2}+1).$

(D) $\frac{1}{3}(\sqrt{2}+1).$



答案
区域



纠错
笔记

261

设区域 D 由 $y = x, y = x + 1, y = 1, y = 3$ 围成, 则 $\iint_D y d\sigma =$

- (A) 2. (B) 3. (C) 4. (D) 6.



262

设积分区域 $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 2x + 2y\}$, 则 $\iint_D (x^2 + xy + y^2) d\sigma =$

- (A) 6π . (B) 8π . (C) 10π . (D) 12π .



微信公众号【顶尖考研】
(ID: djky66)

263

设积分区域 $D = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\}$, 则二重积分

$$I = \iint_D \frac{d\sigma}{(1 + x^2 + y^2)^{\frac{3}{2}}} =$$

- (A) $\frac{\pi}{2}$. (B) $\frac{\pi}{3}$. (C) $\frac{\pi}{4}$. (D) $\frac{\pi}{6}$.



微信公众号: 顶尖考研
(ID: djky66)

264

设积分区域 $D = \{(x, y) \mid |x| \leq 1, |y| \leq 1, x^2 + y^2 \geq x\}$, 则 $\iint_D |xy| d\sigma =$

(A) $\frac{5}{6}$.

(B) $\frac{11}{12}$.

(C) $\frac{3}{4}$.

(D) $\frac{7}{8}$.



答题
区域



纠错
笔记

265

设积分区域 D 是由曲线 $y = \sqrt{x}$, 直线 $y = 1$ 及 y 轴围成, 则 $\iint_D \frac{1}{\sqrt{x}} e^{-y^2} dx dy =$

(A) $1 + \frac{2}{e}$.

(B) $1 - \frac{2}{e}$.

(C) $1 - \frac{1}{e}$.

(D) $1 + \frac{1}{e}$.



答题
区域



纠错
笔记

微信公众号【顶尖考研】
(ID: djky66)

266

设积分区域 D 由 $y = x$ 与 $y^2 = x$ 围成, 则 $\iint_D \frac{\sin \pi y}{y} d\sigma =$

(A) π .

(B) $-\pi$.

(C) $\frac{1}{\pi}$.

(D) $-\frac{1}{\pi}$.



答题
区域



纠错
笔记

顶尖考研：公众号
(ID: djky66)

267 设积分区域 $D = \{(x, y) \mid \sqrt{|x|} + \sqrt{|y|} \leq 1\}$, 则

$$I = \iint_D (\sqrt{|x|} + \sqrt{|y|}) dx dy =$$

(A) $\frac{4}{15}$.

(B) $\frac{2}{5}$.

(C) $\frac{8}{15}$.

(D) $\frac{4}{5}$.



268 设 $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \geq 1, x^2 + y^2 \leq 9, x \leq \sqrt{3}y, y \leq \sqrt{3}x\}$, 则 $\iint_D \arctan \frac{y}{x} d\sigma =$

(A) $\frac{\pi}{6}$.

(B) $\frac{\pi^2}{6}$.

(C) $\frac{\pi}{3}$.

(D) $\frac{\pi^2}{3}$.



269 累次积分 $I = \int_0^1 dy \int_y^1 \sqrt{x^2 + y^2} dx$ 等于

(A) $\frac{\sqrt{2}}{3} + \frac{1}{3} \ln(\sqrt{2} + 1)$.

(B) $\frac{\sqrt{2}}{3} + \frac{1}{3} \ln(\sqrt{2} - 1)$.

(C) $\frac{\sqrt{2}}{6} + \frac{1}{6} \ln(\sqrt{2} + 1)$.

(D) $\frac{\sqrt{2}}{6} + \frac{1}{6} \ln(\sqrt{2} - 1)$.



- 270 设 $I_1 = \iint_D \frac{x+y}{4} dx dy$, $I_2 = \iint_D \sqrt{\frac{x+y}{4}} dx dy$, $I_3 = \iint_D \sqrt[3]{\frac{x+y}{4}} dx dy$, 其中 D 由不等式 $(x-1)^2 + (y-1)^2 \leq 2$ 所确定, 则
- (A) $I_2 < I_3 < I_1$. (B) $I_1 < I_2 < I_3$.
(C) $I_3 < I_1 < I_2$. (D) $I_3 < I_2 < I_1$.



- 271 设平面域 D 由 $x+y = \frac{1}{2}$, $x+y = 1$ 及两条坐标轴围成, $I_1 = \iint_D \ln(x+y)^3 dx dy$, $I_2 = \iint_D (x+y)^3 dx dy$, $I_3 = \iint_D \sin(x+y)^3 dx dy$, 则
- (A) $I_1 < I_2 < I_3$. (B) $I_3 < I_1 < I_2$.
(C) $I_1 < I_3 < I_2$. (D) $I_3 < I_2 < I_1$.



- 272 设积分区域

$$D_1 = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 1\}; D_2 = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 2\}$$

$$D_3 = \{(x, y) \mid \frac{1}{2}x^2 + y^2 \leq 1\}; D_4 = \{(x, y) \mid x^2 + \frac{1}{2}y^2 \leq 1\}$$

记 $I_i = \iint_{D_i} \left[1 - \left(x^2 + \frac{1}{2}y^2 \right) \right] d\sigma (i = 1, 2, 3, 4)$, 则 $\max\{I_1, I_2, I_3, I_4\} =$

- (A) I_1 . (B) I_2 . (C) I_3 . (D) I_4 .



273 设 $g(x)$ 有连续的导数, $g(0) = 0, g'(0) = a \neq 0, f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 的某邻域内连

续, 则 $\lim_{r \rightarrow 0^+} \frac{\iint_{x^2+y^2 \leq r^2} f(x, y) dx dy}{g(r^2)} =$

- (A) $\frac{f(0,0)}{a}$. (B) $\frac{f(0,0)}{2a}$. (C) $\frac{\pi}{a}f(0,0)$. (D) $\frac{\pi}{2a}f(0,0)$.



274 设 $f(x, y)$ 连续, 且 $f(x, y) = xy + \iint_D f(u, v) du dv$, 其中 D 是由 $y = 0, y = x^2, x =$

1 所围区域, 则 $f(x, y)$ 等于

- (A) xy . (B) $2xy$. (C) $xy + \frac{1}{8}$. (D) $xy + 1$.



275 设 $g(x)$ 是可微函数 $y = f(x)$ 的反函数, 且 $f(1) = 0, \int_0^1 xf(x) dx = 1011$, 则

$\int_0^1 dx \int_0^{f(x)} g(t) dt$ 的值为

- (A) 0. (B) 2021. (C) 2022. (D) 2100.



微信公众号: 顶尖考研
(ID: djky66)

线性代数

填空题

276

(2017, 数农)

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & 2 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}.$$



微信公众号【顶尖考研】
(ID: djky66)

277

$$\begin{vmatrix} 2 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 \\ 4 & 0 & 0 & 3 \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}.$$



278

(1988, 数三)

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}.$$



279

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 2^2 & 3^2 & 4^2 \\ 1 & 2^3 & 3^3 & 4^3 \\ 9 & 8 & 7 & 6 \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}.$$



本题有视频讲解的, 答案册扫码。

280

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 4 \\ 0 & 2 & 3 & 0 \\ 0 & 3 & 2 & 0 \\ 4 & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}.$$



281

$$\begin{vmatrix} 5 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 5 & 3 & 4 \\ 3 & 2 & 5 & 4 \\ 4 & 2 & 3 & 5 \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}.$$



282

设四阶方阵 $A = [\alpha, \gamma_2, \gamma_3, \gamma_4]$, $B = [\beta, \gamma_2, \gamma_3, \gamma_4]$, 其中 $\alpha, \beta, \gamma_2, \gamma_3, \gamma_4$ 均为四维列向量, 且 $|A| = 5$, $|B| = -\frac{1}{2}$, 则 $|A + 2B| = \underline{\hspace{2cm}}.$



微信公众号【顶尖考研】
(ID: djky66)

283

设 A, B 均为 n 阶矩阵, 且 $|A| = 2$, $|B| = -3$, 则 $|-A^T B^{-1}| = \underline{\hspace{2cm}}.$



284

设 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$, 将 A 的第二列加到第一列得到矩阵 B , 则 $|A^*B| =$ _____.



285

设 A 是三阶矩阵, 特征值是 $1, 2, -1$, 若 $B = A^2 + 2A + 3E$, 则 $|B| =$ _____.



微信公众号【顶尖考研】
(ID: djky66)

286

已知 $A \sim B$, 其中 $B = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$, 则 $|A + 2E| =$ _____.



微信公众号: 顶尖考研
(ID: djky66)

287

已知 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}$, $\Lambda = \begin{bmatrix} 1 & & \\ & 2 & \\ & & -1 \end{bmatrix}$, 则 $A\Lambda - \Lambda A =$ _____.



288


设 $\alpha = (1, 3, -2)^T$, $\beta = (2, 0, 0)^T$, $A = \alpha\beta^T$, 则 $A^3 =$ _____.



微信公众号【顶尖考研】
(ID: djky66)

289

已知 $A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 4 & -2 & 6 \\ -2 & 1 & -3 \end{bmatrix}$, 则 $A^{10} =$ _____.



290

已知 $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}$, 则 $A^5 =$ _____.

 答题区域

 纠错笔记

291

设 $PA = BP$, 其中 $P = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 4 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 5 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$, 则 $A^{100} =$ _____.

 答题区域

 纠错笔记

微信公众号【顶尖考研】
(ID: djky66)

292

若 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 3 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{bmatrix}$, 则矩阵 A 的伴随矩阵 $A^* =$ _____.

 答题区域

 纠错笔记

293

设矩阵 A 的伴随矩阵 $A^* = \begin{bmatrix} 4 & -2 & 0 & 0 \\ -3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$, 则 $A =$ _____.



294

已知三阶矩阵 A 的逆矩阵为 $A^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$, 则矩阵 A 的伴随矩阵 A^* 的逆矩阵

$(A^*)^{-1} =$ _____.



295

若 $A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, 则 $(\frac{1}{3}A)^{-1} =$ _____.



296

已知 $(A+E)^3 = (A-2E)^3$, 则 $A^{-1} =$ _____.

297

已知 $AB = A + B$, 其中 $B = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$, 则 $(A-E)^{-1} =$ _____.

微信公众号【顶尖考研】
(ID: djky66)

298

已知 $\alpha_1 = (1, 0, 0)^T$, $\alpha_2 = (1, 2, -1)^T$, $\alpha_3 = (-1, 1, 0)^T$ 且 $A\alpha_1 = (2, 1)^T$, $A\alpha_2 = (-1, 1)^T$, $A\alpha_3 = (3, -4)^T$, 则 $A =$ _____.

微信公众号: 顶尖考研
(ID: djky66)

299

若 $\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{bmatrix} A = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 6 \end{bmatrix}$, 则 $A =$ _____.



300

若 $A \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 2 & 0 & -2 \\ 1 & 2 & -1 \end{bmatrix}$, 则 $A =$ _____.



微信公众号【顶尖考研】
(ID: djky66)

301

已知 $A = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$, 又 $BA = A + 2B$, 则 $B =$ _____.



顶尖考研: 公众号
(ID: djky66)

302

四阶矩阵 A 和 B 满足 $2ABA^{-1} = AB + 6E$, 若 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$, 则 $B = \underline{\hspace{2cm}}$.

 答题
区域

 纠错
笔记

303

已知 $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & a & 4 \\ 1 & 0 & 2 & a \\ -1 & a & 1 & 0 \end{bmatrix}$, $r(A) = 3$, 则 $a = \underline{\hspace{2cm}}$.

 答题
区域

 纠错
笔记

微信公众号【顶尖考研】
(ID: djky66)

304

已知 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 4 & 5 & 6 \\ 4 & 5 & 6 & 7 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & -1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$, 则秩 $r(AB + 2A) = \underline{\hspace{2cm}}$.

 答题
区域

 纠错
笔记

305

已知 $A = [\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3]$ 是三阶矩阵, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 是三维列向量, 其中 α_1, α_2 坐标不成比例, α_4 不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表出, 则 $r(A) =$ _____.



306

设 A 是 5×4 矩阵, 若 η_1, η_2 是齐次方程组 $Ax = 0$ 的基础解系, 则 $r(A^T) =$ _____.



微信公众号【顶尖考研】
(ID: djky66)

307

已知 $A \sim B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \end{bmatrix}$, 则 $r(A - E) + r(A + E) =$ _____.



308

设 $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -1 & -2 & 2 \\ 0 & 2 & a \end{bmatrix}$ 与 $B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & -1 & 0 \\ 4 & -1 & 2 \end{bmatrix}$ 等价, 则 $a =$ _____.



309

已知矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & a+2 \\ 1 & a & -2 \end{bmatrix}$ 和 $B = \begin{bmatrix} 1 & 1 & a \\ -1 & a & 1 \\ 1 & -1 & 2 \end{bmatrix}$ 不等价, 则 $a =$ _____.



微信公众号【顶尖考研】
(ID: djky66)

310

已知向量组 $\alpha_1 = (1, 2, 3)^T, \alpha_2 = (3, -1, 2)^T, \alpha_3 = (2, 3, t)^T$ 线性相关, 则 $t =$ _____.



微信公众号: 顶尖考研
(ID: djky66)

311 (1997, 数二) 已知向量组 $\alpha_1 = (1, 2, -1, 1)^T, \alpha_2 = (2, 0, t, 0)^T, \alpha_3 = (0, -4, 5, t)^T$ 线性无关, 则 t 的取值为_____.



312 已知向量组 $\alpha_1 = (a+1, 1, a)^T, \alpha_2 = (a, -2, 2-a)^T, \alpha_3 = (a-1, -3, 4-a)^T$ 线性相关, 则 $a =$ _____.



微信公众号【顶尖考研】
(ID: djky66)

313 已知 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 若 $\alpha_1 + 2\alpha_2 + \alpha_3, \alpha_1 + a\alpha_2, 3\alpha_2 + \alpha_3$ 线性相关, 则 $a =$ _____.



顶尖考研公众号
(ID: djky66)

314 已知 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 若 $\alpha_1 - 3\alpha_3, a\alpha_1 + \alpha_2 + 2\alpha_3, 2\alpha_1 + 3\alpha_2 + \alpha_3$ 亦线性无关, 则 a 的取值_____.



315 已知 $\alpha_1 = (1, 2, 1)^T, \alpha_2 = (2, 3, a)^T, \alpha_3 = (1, a+2, -2)^T, \beta = (1, 3, 0)^T$. 若 β 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示, 且表示法不唯一, 则 $a =$ _____.



微信公众号【顶尖考研】
(ID: djky66)

316 已知 $\alpha_1 = (1, 3, 2, 0)^T, \alpha_2 = (2, -1, 4, 1)^T, \alpha_3 = (5, 1, 6, 2)^T, \beta = (7, a, 14, 3)^T$, 且 β 不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示, 则 a 的取值_____.



317 已知 $\alpha_1 = (1, 4, 2)^T$, $\alpha_2 = (2, 7, 3)^T$, $\alpha_3 = (0, 1, a)^T$ 可以表示任意一个三维向量, 则 a 的取值为_____.



318 已知向量组 $\alpha_1 = (a, a, 1)^T$, $\alpha_2 = (a, 1, a)^T$, $\alpha_3 = (1, a, a)^T$ 的秩是 2, 则 $a =$ _____.



微信公众号【顶尖考研】
(ID: djky66)

319 向量组 $\alpha_1 = (2, 1, 3)^T$, $\alpha_2 = (1, 2, 1)^T$, $\alpha_3 = (3, 3, 4)^T$, $\alpha_4 = (5, 1, 8)^T$, $\alpha_5 = (0, 0, 2)^T$ 的一个极大线性无关组是_____.



320

已知 α_1, α_2 是向量组 $\alpha_1 = (1, 4, 3)^T, \alpha_2 = (2, a, -1)^T, \alpha_3 = (a+1, 3, 1)^T$ 的一个极大线性无关组, 则 $a =$ _____.



321

齐次线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 + x_4 = 0 \\ 2x_1 - x_2 + x_3 - 3x_4 = 0 \\ x_1 \quad \quad + x_3 - x_4 = 0 \end{cases}$$

的基础解系是_____.



微信公众号【顶尖考研】
(ID: djky66)

322

齐次线性方程组

$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 + 4x_3 - 7x_4 = 0 \\ 2x_1 + x_2 - 2x_3 + x_4 = 0 \\ 3x_1 - x_2 + 2x_3 - 4x_4 = 0 \end{cases}$$

的基础解系是_____.



微信公众号: 顶尖考研
(ID: djky66)

323

已知齐次线性方程组
$$\begin{cases} ax_1 - 3x_2 + 3x_3 = 0 \\ x_1 + (a+2)x_2 + 3x_3 = 0 \\ 2x_1 + x_2 - x_3 = 0 \end{cases}$$
 有无穷多解, 则 $a =$ _____.



324

已知方程组

$$\begin{cases} ax_1 + x_2 + x_3 = a - 3 \\ x_1 + ax_2 + x_3 = -2 \\ x_1 + x_2 + ax_3 = -2 \end{cases}$$

有无穷多解, 则 $a =$ _____.



微信公众号【顶尖考研】
(ID: djky66)

325

(2002, 数二) 矩阵 $A = \begin{bmatrix} 0 & -2 & -2 \\ 2 & 2 & -2 \\ -2 & -2 & 2 \end{bmatrix}$ 的非零特征值是_____.



326

已知 $A = \alpha\alpha^T$, 其中 $\alpha = (1, 0, 2)^T$, 则矩阵 A 的特征值_____.
 答题
区域

 纠错
笔记

327

已知 $\alpha = (a, 1, 1)^T$ 是矩阵 $A = \begin{bmatrix} -1 & 2 & 2 \\ 2 & a & -2 \\ 2 & -2 & -1 \end{bmatrix}$ 的逆矩阵的特征向量, 那么 α 在矩阵 A 中对应的特征值是_____.
 答题
区域

 纠错
笔记

微信公众号【顶尖考研】
(ID: djky66)

328

(1987, 数四) 矩阵 $A = \begin{bmatrix} -3 & -1 & 2 \\ 0 & -1 & 4 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ 的实特征值所对应的特征向量是_____.
 答题
区域

 纠错
笔记

329 已知 A 是三阶矩阵, 且矩阵 A 各行元素之和均为 5, 则矩阵 A 必有特征向量_____.



330 已知 A 是三阶实对称矩阵, 特征值是 $1, 3, -2$, 其中 $\alpha_1 = (1, 2, -2)^T, \alpha_2 = (4, -1, a)^T$ 分别是属于特征值 $\lambda = 1$ 与 $\lambda = 3$ 的特征向量, 那么矩阵 A 属于特征值 $\lambda = -2$ 的特征向量是_____.



微信公众号【顶尖考研】
(ID: djky66)

331 已知 $P^{-1}AP = \begin{bmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & -1 \end{bmatrix}$, $P = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ 可逆, 则矩阵 A 关于特征值 $\lambda = 1$ 的特征向量是_____.



332

已知矩阵 $A = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & a & b \\ 0 & 2 & 3 \end{bmatrix}$ 和 $B = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$ 相似, 则 $b =$ _____.

 答题
区域

 纠错
笔记

333

已知矩阵 $A = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & a \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$ 和对角矩阵相似, 则 $a =$ _____.

 答题
区域

 纠错
笔记

微信公众号【顶尖考研】
(ID: djky66)

334

设 A 是三阶矩阵, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是三维线性无关的列向量, 且 $A\alpha_1 = \alpha_2 + \alpha_3, A\alpha_2 = \alpha_1 + \alpha_3, A\alpha_3 = \alpha_1 + \alpha_2$, 则和 A 相似的矩阵是 _____.

 答题
区域

 纠错
笔记

微信公众号: 顶尖考研
(ID: djky66)

335

已知 A 是三阶实对称矩阵, 若正交矩阵 Q 使得 $Q^{-1}AQ = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 6 \end{bmatrix}$, 如果 $\alpha_1 = (1, 0, -1)^T$, $\alpha_2 = (0, 1, 1)^T$ 是矩阵 A 属于特征值 $\lambda = 3$ 的特征向量, 则 $Q =$ _____.



336

已知二次型 $x^T Ax$ 矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & a & -1 \\ a & 3 & -2 \\ -1 & -2 & 0 \end{bmatrix}$, 则二次型表达式为 _____.



微信公众号【顶尖考研】
(ID: djky66)

337

已知二次型 $x^T Ax = ax_1^2 + 2x_2^2 + ax_3^2 + 6x_1x_2 + 2x_2x_3$ 的秩为 2, 则 $a =$ _____.



顶尖考研: 公众号
(ID: djky66)

338 向量 $\beta = (1, -2, 4)^T$ 在基 $\alpha_1 = (1, 2, 4)^T, \alpha_2 = (1, -1, 1)^T, \alpha_3 = (1, 3, 9)^T$ 的坐标是_____.



339 已知 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是三维向量空间的一个基底, 若

$$\beta_1 = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3, \beta_2 = 3\alpha_2 + \alpha_3, \beta_3 = \alpha_1 - \alpha_2,$$

则由基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 到基 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 的过渡矩阵是_____.



微信公众号【顶尖考研】
(ID: djky66)

340 若二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = ax_1^2 + 4x_2^2 + ax_3^2 + 6x_1x_2 + 2x_2x_3$ 是正定的, 则 a 的取值范围是_____.



选 择 题

341 设 $A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$, 且 $|A| = m$, $B = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{21} & a_{31} \\ a_{13} & a_{23} & a_{33} \\ 2a_{11} + a_{12} & 2a_{21} + a_{22} & 2a_{31} + a_{32} \end{bmatrix}$,
 则 $|B| =$
 (A) m . (B) $-m$. (C) $2m$. (D) $-2m$.



微信公众号【顶尖考研】
 (ID: djky66)

342 (2013, 数农) $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 3 \\ 4 & 0 & 0 & 4 \end{vmatrix} =$

- (A) 48. (B) 24. (C) 12. (D) 0.



343 下列行列式中,行列式的值不等于 24 的是

(A) $\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 2 & 0 & 0 \\ 3 & 3 & 3 & 0 \\ 4 & 4 & 4 & 4 \end{vmatrix}$. (B) $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 & 0 \\ 3 & 3 & 0 & 0 \\ 4 & 0 & 0 & 0 \end{vmatrix}$. (C) $\begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 2 & 0 \\ 3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \end{vmatrix}$. (D) $\begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \\ 3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 0 \end{vmatrix}$.

答案
区域

纠错
笔记

344 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 为三维列向量, 矩阵 $A = [\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3]$, $B = [\alpha_3, 2\alpha_1 + \alpha_2, 3\alpha_2]$, 若行列式 $|A| = 2$, 则行列式 $|B| =$

- (A) 6. (B) -6. (C) 12. (D) -12.

答案
区域

纠错
笔记

345 设 $A = [\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3]$ 是三阶矩阵, 则下列行列式中等于 $|A|$ 的是

- (A) $|\alpha_1 - \alpha_2, \alpha_2 - \alpha_3, \alpha_3 - \alpha_1|$. (B) $|\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 + \alpha_1|$.
(C) $|\alpha_1 + 2\alpha_2, \alpha_3, \alpha_1 + \alpha_2|$. (D) $|\alpha_1, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_1 + \alpha_2|$.

答案
区域

纠错
笔记

微信公众号: 顶尖考研
(ID: djky66)

346

设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_1, \beta_2$ 均为四维列向量, $|\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_1| = a, |\alpha_1, \alpha_2, \beta_2, \alpha_3| = b$, 则 $|\alpha_3, \alpha_2, \alpha_1, \beta_1 + 2\beta_2| =$

(A) $2a - b$.

(B) $2a + b$.

(C) $2b - a$.

(D) $2b + a$.



答案
区域



纠错
笔记

347

(1990, 数五) 设 A 是 n 阶可逆矩阵, A^* 是 A 的伴随矩阵, 则

(A) $|A^*| = |A|^{n-1}$.

(B) $|A^*| = |A|$.

(C) $|A^*| = |A|^n$.

(D) $|A^*| = |A^{-1}|$.



答案
区域



纠错
笔记

微信公众号【顶尖考研】
(ID: djky66)

348

已知 A 是三阶矩阵, 且 $|A| = -2$, 则 $\left| \frac{1}{3}A^* \right| =$

(A) $\frac{8}{27}$.

(B) $\frac{4}{27}$.

(C) $\frac{2}{3}$.

(D) $\frac{4}{3}$.



答案
区域



纠错
笔记

349

(2017, 数农) 已知 A 是三阶矩阵且 $(A - E)^{-1} = A^2 + A + E$, 则 $|A| =$

(A) 0.

(B) 2.

(C) 4.

(D) 8.



350

设 $J = \begin{bmatrix} 0 & 1 & & \\ & 0 & 1 & \\ & & \ddots & \ddots \\ & & & 1 & \\ & & & & 0 \end{bmatrix}$ 和 $A = [a_{ij}]$ 都是 n 阶矩阵, 则 $AJ =$

(A) $\begin{bmatrix} 0 & a_{11} & \cdots & a_{1,n-1} \\ 0 & a_{21} & \cdots & a_{2,n-1} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & a_{n1} & \cdots & a_{n,n-1} \end{bmatrix}$.

(B) $\begin{bmatrix} 0 & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}$.

(C) $\begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1,n-1} & 0 \\ a_{21} & \cdots & a_{2,n-1} & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{n,n-1} & 0 \end{bmatrix}$.

(D) $\begin{bmatrix} a_{12} & \cdots & a_{1n} & 0 \\ a_{22} & \cdots & a_{2n} & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{n2} & \cdots & a_{nn} & 0 \end{bmatrix}$.



351

已知 α, β 是 n 维列向量, 正确的结论是

(A) $\alpha\beta^T = \beta\alpha^T$.

(B) $\alpha^T\beta = \beta^T\alpha$.

(C) $\alpha\beta^T = \alpha^T\beta$.

(D) $\alpha^T\beta\alpha^T = \beta^T\alpha\beta^T$.



微信公众号: 顶尖考研
(ID: djky66)

352 设 A 是 n 阶矩阵, A^T 是 A 的转置矩阵, A^* 是 A 的伴随矩阵, E 是 n 阶单位矩阵, Λ_1, Λ_2 都是 n 阶对角矩阵, 在下列运算中:

$$AA^* = A^*A, \quad \Lambda_1\Lambda_2 = \Lambda_2\Lambda_1, \quad A^mA^t = A^tA^m,$$

$$AA^T = A^TA, \quad A\Lambda_1 = \Lambda_1A, \quad (A+E)(A-E) = (A-E)(A+E)$$

交换律肯定成立的共有

- (A) 2 个. (B) 3 个. (C) 4 个. (D) 5 个.



353 已知 A 是 n 阶可逆矩阵, 则错误的法则是

(A) $(2A)^T = 2A^T$.

(B) $(A^2)^T = (A^T)^2$.

(C) $(2A)^* = 2A^*$.

(D) $(A^2)^* = (A^*)^2$.



354 A 是 n 阶矩阵, 下列命题中正确的是

(A) 如果 $A^2 = E$, 则必有 $A = E$ 或 $A = -E$.

(B) 如果 $A^2 = O$, 则必有 $A = O$.

(C) 如果 $A^2 = A$ 且 $A \neq O$, 则 $A = E$.

(D) 如果 $A^TA = O$, 则 $A = O$.



355 A, B 都是 n 阶矩阵, 下列命题中正确的是

- (A) $AB \neq O \Leftrightarrow A \neq O$ 且 $B \neq O$.
 (B) 如 $AB = O$, 则必有 $A = O$ 或 $B = O$.
 (C) 如 $AB = O$, 则 $|A| = 0$ 或 $|B| = 0$.
 (D) 如 $AB = B$, 则 $A = E$.



356 设 $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$, 则 $A^* =$

- (A) $\begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$. (B) $\begin{bmatrix} -d & b \\ c & -a \end{bmatrix}$. (C) $\begin{bmatrix} d & b \\ c & a \end{bmatrix}$. (D) $\begin{bmatrix} d & -c \\ -b & a \end{bmatrix}$.



微信公众号【顶尖考研】
(ID: djky66)

357 (2018, 数农) 矩阵 $\begin{bmatrix} 0 & 0 & a \\ 0 & b & 0 \\ c & 0 & 0 \end{bmatrix}$ 的伴随矩阵为

- (A) $\begin{bmatrix} 0 & 0 & -bc \\ 0 & -ac & 0 \\ -ab & 0 & 0 \end{bmatrix}$. (B) $\begin{bmatrix} 0 & 0 & -ab \\ 0 & -ac & 0 \\ -bc & 0 & 0 \end{bmatrix}$.
 (C) $\begin{bmatrix} 0 & 0 & -bc \\ 0 & ac & 0 \\ -ab & 0 & 0 \end{bmatrix}$. (D) $\begin{bmatrix} 0 & 0 & -ab \\ 0 & ac & 0 \\ -bc & 0 & 0 \end{bmatrix}$.



本题有视频讲解哟, 答案册扫码。

358 已知 A, B 均是 n 阶可逆矩阵, 则错误的是

(A) $\begin{bmatrix} A & O \\ O & B \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} A^{-1} & O \\ O & B^{-1} \end{bmatrix}.$

(B) $\begin{bmatrix} O & A \\ B & O \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} O & B^{-1} \\ A^{-1} & O \end{bmatrix}.$

(C) $\begin{bmatrix} A & O \\ O & B \end{bmatrix}^n = \begin{bmatrix} A^n & O \\ O & B^n \end{bmatrix}.$

(D) $\begin{bmatrix} O & A \\ B & O \end{bmatrix}^n = \begin{bmatrix} O & A^n \\ B^n & O \end{bmatrix}.$



答题
区域



纠错
笔记

359

设 $A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 5 & 2 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 0 \end{bmatrix}$, 则 $A^{-1} =$

(A) $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & -2 & 5 \\ 2 & -3 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$

(B) $\begin{bmatrix} 0 & 0 & -2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 1 & -2 & 0 & 0 \\ -2 & 5 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$

(C) $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & -1 & 2 \\ 1 & -2 & 0 & 0 \\ -2 & 5 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$

(D) $\begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \\ -1 & 2 & 0 & 0 \\ 2 & -5 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$



答题
区域



纠错
笔记

360

(2012, 数农) 设矩阵 $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$, E 为单位矩阵, $BA = B + 2E$, 则 $B =$

(A) $\begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}.$

(B) $\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}.$

(C) $\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}.$

(D) $\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}.$



答题
区域



纠错
笔记

361 已知 $XA + 2E = X + B$, 其中 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$, 则 $X =$

- (A) $\begin{bmatrix} 1 & -3 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$. (B) $\begin{bmatrix} -1 & 3 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$. (C) $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -\frac{3}{2} & 1 \end{bmatrix}$. (D) $\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ -3 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$.



362 设 A, B 均为 n 阶可逆矩阵, 正确的法则是

- (A) $(A+B)(A-B) = A^2 - B^2$. (B) $(A+B)^{-1} = A^{-1} + B^{-1}$.
(C) $(A+B)^2 = A^2 + 2AB + B^2$. (D) $(AB)^* = B^*A^*$.



363 已知 A 是任意一个 n 阶矩阵, 则

- ① $A + A^T$; ② $A - A^T$; ③ AA^T ; ④ AA^* ; ⑤ $A^T A$.

上述矩阵中, 对称矩阵一共有

- (A) 2 个. (B) 3 个. (C) 4 个. (D) 5 个.



微信公众号: 顶尖考研
(ID: djky66)

364 设 A, B, C 均为 n 阶矩阵, 其中 A, B 是对称的, 则下列结论不正确的是

(A) $A + B$ 是对称矩阵.

(B) AB 是对称矩阵.

(C) $C^T AC$ 是对称矩阵.

(D) ABA 是对称矩阵.



365 下列矩阵中, 行最简矩阵是

(A) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

(B) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

(C) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

(D) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$



366 下列矩阵中, 初等矩阵是

(A) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$

(B) $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

(C) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$

(D) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & \sqrt{2} \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$



367

已知 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}$, $P_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}$, $P_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, 则 $P_2 A P_1 =$

- (A) $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 4 & 5 & 1 \\ 3 & 3 & 0 \end{bmatrix}$. (B) $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \\ 3 & 3 & 3 \end{bmatrix}$. (C) $\begin{bmatrix} 1 & -1 & 3 \\ -3 & 0 & -3 \\ 7 & -1 & 9 \end{bmatrix}$. (D) $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 4 & 4 & 1 \\ 7 & 7 & 1 \end{bmatrix}$.

答题
区域

纠错
笔记

368

设 $A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} a_{31} & a_{32} & a_{33} + a_{31} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} + a_{21} \\ a_{11} & a_{12} & a_{13} + a_{11} \end{bmatrix}$, $P_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$,

$P_2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$, 则 $B =$

- (A) $P_1 A P_2$. (B) $P_2 A P_1$. (C) $A P_1 P_2$. (D) $P_1 P_2 A$.

答题
区域

纠错
笔记

369

设 $A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{31} + 2a_{11} & a_{32} + 2a_{12} & a_{33} + 2a_{13} \end{bmatrix}$,

$P_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, $P_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{bmatrix}$, $P_3 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$,

则 $B =$

- (A) $P_1 P_3 A$. (B) $P_2 P_3 A$. (C) $A P_3 P_2$. (D) $A P_1 P_3$.

答题
区域

纠错
笔记

370 已知 A 是三阶矩阵, 将 A 的 1, 2 两行互换得到矩阵 B , 再将 B 第三列的 -2 倍加到第一列得到单位矩阵, 则 $A =$

(A) $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{bmatrix}$.

(B) $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ -2 & 0 & 1 \end{bmatrix}$.

(C) $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{bmatrix}$.

(D) $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 1 \end{bmatrix}$.



371 设 A 为三阶可逆矩阵, 将 A 的第 1 行乘以 -2 得到矩阵 B , 则

(A) A^{-1} 的第 1 行乘以 -2 得到矩阵 B^{-1} .

(B) A^{-1} 的第 1 列乘以 $-\frac{1}{2}$ 得到矩阵 B^{-1} .

(C) A^{-1} 的第 1 行乘以 2 得到矩阵 B^{-1} .

(D) A^{-1} 的第 1 列乘以 $\frac{1}{2}$ 得到矩阵 B^{-1} .



372 已知 $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 2 & 3 & 5 \\ 1 & a & 10 \end{bmatrix}$, 且秩 $r(A) = 2$, 则 $a =$

(A) 1.

(B) -2 .

(C) 3.

(D) -1 .



373 若矩阵 A 的秩为 r , 则下列命题中, 正确的是

- ① A 中所有 r 阶子式均不为 0. ② A 中存在 r 阶子式不为 0.
 ③ A 中所有 $r-1$ 阶子式均不为 0. ④ A 中所有 $r+1$ 阶子式全为 0.
 (A) ①④. (B) ②③.
 (C) ①③. (D) ②④.

答题
区域

纠错
笔记

374 已知 a 是任意常数, 下列矩阵中秩有可能不等于 3 的是

$$(A) \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & a & 0 \\ 0 & 0 & 1 & a-1 \end{bmatrix}.$$

$$(B) \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & a & 0 \\ 0 & 0 & a & a+1 \end{bmatrix}.$$

$$(C) \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & a & 0 \\ 0 & 0 & 0 & a \\ 0 & 0 & 0 & a+1 \end{bmatrix}.$$

$$(D) \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & a & 0 \\ 0 & 0 & 0 & a+1 \\ 0 & 0 & 0 & 2a+2 \end{bmatrix}.$$

答题
区域

纠错
笔记

375 设 A, B 都是四阶非零矩阵, 且 $AB = O$, 则必有

- (A) 若 $r(A) = 1$, 则 $r(B) = 3$. (B) 若 $r(A) = 2$, 则 $r(B) = 2$.
 (C) 若 $r(A) = 3$, 则 $r(B) = 1$. (D) 若 $r(A) = 4$, 则 $r(B) = 1$.

答题
区域

纠错
笔记

微信公众号: 顶尖考研
(ID: djky66)

376

设 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & a & 3 \\ 4 & 4 & 5 \end{bmatrix}$, B 是三阶非零矩阵, 满足 $AB = O$, 则 $r(B) =$

(A) 1.

(B) 2.

(C) 3.

(D) 与 a 有关.



377

已知 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 3 & a & 2 \\ a & 4 & a \end{bmatrix}$, 则 $a = -2$ 是 $r(A) = 2$ 的

(A) 充分而非必要条件.

(B) 必要而非充分条件.

(C) 充分且必要条件.

(D) 既不充分也不必要条件.



378

已知 $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & a \\ 2 & 3 & a & 4 \\ 3 & 5 & 1 & 9 \end{bmatrix}$, A^* 是 A 的伴随矩阵, 若 $r(A^*) = 1$, 则 $a =$

(A) 3.

(B) 2.

(C) 1.

(D) 1 或 3.



379 现有四个向量组

- ① $(1, 2, 3)^T, (3, -1, 5)^T, (0, 4, -2)^T, (1, 3, 0)^T$
 ② $(a, 1, b, 0, 0)^T, (c, 0, d, 2, 0)^T, (e, 0, f, 0, 3)^T$
 ③ $(a, 1, 2, 3)^T, (b, 1, 2, 3)^T, (c, 3, 4, 5)^T, (d, 0, 0, 0)^T$
 ④ $(1, 0, 3, 1)^T, (-1, 3, 0, -2)^T, (2, 1, 7, 2)^T, (4, 2, 14, 5)^T$

则下列结论正确的是

- (A) 线性相关的向量组为 ①④; 线性无关的向量组为 ②③.
 (B) 线性相关的向量组为 ③④; 线性无关的向量组为 ①②.
 (C) 线性相关的向量组为 ①②; 线性无关的向量组为 ③④.
 (D) 线性相关的向量组为 ①③④; 线性无关的向量组为 ②.

答题
区域

纠错
笔记

380 当向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性相关时, 使等式

$$k_1 \alpha_1 + k_2 \alpha_2 + \dots + k_s \alpha_s = 0$$

成立的常数 $k_1, k_2, \dots, k_s$ 是

- (A) 某些全不为 0 的常数. (B) 任意一组不全为 0 的常数.
 (C) 唯一一组不全为 0 的常数. (D) 无穷多组特定的不全为 0 的常数.

答题
区域

纠错
笔记

381 已知向量组 $\alpha_1 = (1, 1, t)^T, \alpha_2 = (1, t, 1)^T, \alpha_3 = (t, 1, 1)^T$ 线性相关, 而 $\beta_1 = (1, 3, 2)^T, \beta_2 = (2, 7, t+4)^T, \beta_3 = (0, t+2, 3)^T$ 线性无关, 则

- (A) $t \neq -3$. (B) $t = 1$. (C) $t = -2$. (D) $t = -3$.

答题
区域

纠错
笔记

微信公众号: 顶尖考研
(ID: djky66)

382

(2012, 数一、二、三) 设 $\alpha_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ c_1 \end{bmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ c_2 \end{bmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ c_3 \end{bmatrix}$, $\alpha_4 = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ c_4 \end{bmatrix}$, 其中 c_1, c_2, c_3, c_4 为任意常数, 则下列向量组线性相关的是

- (A) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$. (B) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$. (C) $\alpha_1, \alpha_3, \alpha_4$. (D) $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$.



答案
区域



纠错
笔记

383

设 n 阶矩阵 A , 则 $|A| = 0$ 的充分必要条件是

- (A) A 的列向量线性相关.
(B) A 的列向量线性无关.
(C) A 中每一个列向量都可由其它列向量线性表示.
(D) A 中一定有 2 个列向量坐标成比例.



答案
区域



纠错
笔记

384

向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性无关的充分必要条件是

- (A) $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 均不是零向量.
(B) $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 中任意 $s-1$ 个向量都线性无关.
(C) 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s, \alpha_{s+1}$ 线性无关.
(D) $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 中每一个向量都不能由其余 $s-1$ 个向量线性表出.



答案
区域



纠错
笔记

385 设向量组(I): $\alpha_1 = (a_{11}, a_{12}, a_{13})$, $\alpha_2 = (a_{21}, a_{22}, a_{23})$, $\alpha_3 = (a_{31}, a_{32}, a_{33})$; 向量组(II):

$\beta_1 = (a_{11}, a_{12}, a_{13}, a_{14})$, $\beta_2 = (a_{21}, a_{22}, a_{23}, a_{24})$, $\beta_3 = (a_{31}, a_{32}, a_{33}, a_{34})$, 则正确的命题是

(A) (I) 相关 $\Rightarrow$ (II) 相关.

(B) (I) 无关 $\Rightarrow$ (II) 无关.

(C) (II) 无关 $\Rightarrow$ (I) 无关.

(D) (II) 相关 $\Rightarrow$ (I) 无关.



386 设向量组(I): $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$; 向量组(II): $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s, \alpha_{s+1}, \dots, \alpha_{s+t}$, 则正确命题是

(A) (I) 无关 $\Rightarrow$ (II) 无关.

(B) (I) 无关 $\Rightarrow$ (II) 相关.

(C) (II) 相关 $\Rightarrow$ (I) 相关.

(D) (II) 无关 $\Rightarrow$ (I) 无关.



微信公众号【顶尖考研】
(ID: djky66)

387 设 $A = [\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n]$, $B = [\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n]$, $AB = [\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_n]$ 都是 n 阶矩阵, 记

向量组(I) $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$; (II) $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$; (III) $\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_n$. 若向量组(III) 线性相关, 则

(A) (I)、(II) 均线性相关.

(B) (I) 或 (II) 中至少有一个线性相关.

(C) (I) 一定线性相关.

(D) (II) 一定线性相关.



388 已知四维列向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性无关, 则下列向量组中线性无关的是

- (A) $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 + \alpha_4, \alpha_4 + \alpha_1$. (B) $\alpha_1 - \alpha_2, \alpha_2 - \alpha_3, \alpha_3 - \alpha_4, \alpha_4 - \alpha_1$.
(C) $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 - \alpha_3, \alpha_3 - \alpha_4, \alpha_4 + \alpha_1$. (D) $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 - \alpha_3, \alpha_3 - \alpha_4, \alpha_4 - \alpha_1$.



答题
区域



纠错
笔记

389 已知 n 维向量 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 则下列向量组中线性无关的是

- (A) $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 + \alpha_1$. (B) $\alpha_1 - \alpha_2, \alpha_2 - \alpha_3, \alpha_3 - \alpha_1$.
(C) $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 - \alpha_3, \alpha_3 + \alpha_1$. (D) $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_1 + 2\alpha_2 + \alpha_3$.



答题
区域



纠错
笔记

微信公众号【顶尖考研】
(ID: djky66)

390 设 $\alpha_1 = (1, 0, 0)^T, \alpha_2 = (0, 0, 5)^T, \beta$ 为 α_1, α_2 的线性组合, 则 β 可能是

- (A) $(0, 1, 0)^T$. (B) $(1, 3, 5)^T$. (C) $(5, 0, 1)^T$. (D) $(0, 1, 5)^T$.



答题
区域



纠错
笔记

391 已知 $\beta_1 = (4, -2, a)^T, \beta_2 = (7, b, 4)^T$ 可由 $\alpha_1 = (1, 2, 3)^T, \alpha_2 = (-2, 1, -1)^T$ 线性表示, 则

(A) $a = 2, b = -3.$

(B) $a = -2, b = 3.$

(C) $a = 2, b = 3.$

(D) $a = -2, b = -3.$



本题有视频讲解哟, 答案册扫码.

392 若向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$ 线性相关, 则

(A) α_1 必可由 $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性表示.

(B) α_2 必可由 $\alpha_1, \alpha_3, \alpha_4$ 线性表示.

(C) α_3 必可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$ 线性表示.

(D) α_4 必可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示.



微信公众号【顶尖考研】
(ID: djky66)

393 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 向量 β_1 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示, 向量 β_2 不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示, 则必有

(A) $\alpha_1, \alpha_2, \beta_1$ 线性无关.

(B) $\alpha_1, \alpha_2, \beta_2$ 线性无关.

(C) $\alpha_2, \alpha_3, \beta_1, \beta_2$ 线性相关.

(D) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_1 + \beta_2$ 线性相关.



394 如果向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 的秩为 r , 则下列命题中正确的是

- (A) 向量组中任意 $r-1$ 个向量都线性无关.
- (B) 向量组中任意 r 个向量都线性无关.
- (C) 向量组中任意 $r-1$ 个向量都线性相关.
- (D) 向量组中任意 $r+1$ 个向量都线性相关.



395 向量组 $\alpha_1 = (1, 3, 5, -1)^T, \alpha_2 = (2, -1, -3, 4)^T, \alpha_3 = (6, 4, 4, 6)^T, \alpha_4 = (7, 7, 9, 1)^T, \alpha_5 = (3, 2, 2, 3)^T$ 的极大线性无关组是

- (A) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_5.$
- (B) $\alpha_1, \alpha_3, \alpha_5.$
- (C) $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4.$
- (D) $\alpha_3, \alpha_4, \alpha_5.$



微信公众号【顶尖考研】
(ID: djky66)

396 $a = 1$ 是向量组 $\alpha_1 = (1, 1, a)^T, \alpha_2 = (1, a, 1)^T, \alpha_3 = (a, 1, 1)^T, \alpha_4 = (-2, -2, a + 6)^T$ 的秩为 2 的

- (A) 充分必要条件.
- (B) 充分而非必要条件.
- (C) 必要而非充分条件.
- (D) 既非充分又非必要条件.



- 397 已知四维向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性无关, 且向量 $\beta_1 = \alpha_1 + \alpha_3 + \alpha_4, \beta_2 = \alpha_2 - \alpha_4, \beta_3 = \alpha_3 + \alpha_4, \beta_4 = \alpha_2 + \alpha_3, \beta_5 = 2\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3$. 则 $r(\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5) =$
 (A) 1. (B) 2. (C) 3. (D) 4.



- 398 某五元齐次线性方程组经高斯消元, 系数矩阵化为

$$\begin{bmatrix} 1 & -2 & 2 & 3 & -4 \\ & 1 & 5 & -2 & \\ & & 2 & 0 & \end{bmatrix},$$

选取自由变量不能是

- (A) x_2, x_5 . (B) x_1, x_5 . (C) x_3, x_5 . (D) x_2, x_3 .



本题有视频讲解哟, 答案册扫码.

- 399 已知 α_1, α_2 是非齐次线性方程组 $Ax = b$ 的两个不同的解, 那么

$$\alpha_1 - \alpha_2, \quad 3\alpha_1 - 2\alpha_2, \quad \frac{1}{3}(\alpha_1 + 2\alpha_2), \quad \frac{1}{2}(\alpha_1 + \alpha_2)$$

中, 仍是线性方程组 $Ax = b$ 特解的共有

- (A) 4 个. (B) 3 个. (C) 2 个. (D) 1 个.



微信公众号: 顶尖考研
(ID: djky66)

400 已知 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是非齐次线性方程组 $Ax = b$ 的三个不同的解, 那么下列向量

$$\alpha_1 - \alpha_2, \quad \alpha_1 + \alpha_2 - 2\alpha_3, \quad \frac{2}{3}(\alpha_2 - \alpha_1), \quad \alpha_1 - 3\alpha_2 + 2\alpha_3$$

中是导出组 $Ax = 0$ 解的向量共有

- (A) 4 个. (B) 3 个. (C) 2 个. (D) 1 个.



401 已知齐次线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - 2x_3 = 0 \\ 2x_1 - x_2 + ax_3 = 0 \\ 3x_1 + x_2 - x_3 = 0 \end{cases}$$

有无穷多解, 则 $a =$

- (A) 0. (B) -1. (C) 1. (D) 2.



402 齐次线性方程组 $\begin{cases} x_1 + 2x_3 - x_4 = 0 \\ x_1 + x_2 + x_4 = 0 \end{cases}$ 的基础解系是

- (A) $(-2, 2, 1, 0)^T, (1, 2, 0, 1)^T$. (B) $(-1, 0, 1, 1)^T, (2, 0, -2, -2)^T$.
(C) $(-2, 2, 1, 0)^T, (2, 2, -3, -4)^T$. (D) $(1, -2, 0, 1)^T$.



403 已知 $\alpha_1 = (1, 1, -1)^T$, $\alpha_2 = (1, 2, 0)^T$ 是齐次方程组 $Ax = 0$ 的基础解系, 那么下列向量中 $Ax = 0$ 的解向量是

- (A) $(1, -1, 3)^T$. (B) $(2, 1, -3)^T$. (C) $(2, 2, -5)^T$. (D) $(2, -2, 6)^T$.



404 设 A 是 $m \times n$ 矩阵, A^T 是 A 的转置, 若 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_t$ 是齐次方程组 $A^T x = 0$ 的基础解系, 则秩 $r(A) =$

- (A) t . (B) $n - t$. (C) $m - t$. (D) $n - m$.



微信公众号【顶尖考研】
(ID: djky66)

405 要使 $\alpha_1 = (2, 1, 1)^T$, $\alpha_2 = (1, -2, -1)^T$ 都是齐次线性方程组 $Ax = 0$ 的解, 只要系数矩阵 A 为

(A) $\begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & -1 \end{bmatrix}$.

(B) $\begin{bmatrix} 1 & 3 & -5 \\ -1 & -3 & 5 \end{bmatrix}$.

(C) $\begin{bmatrix} 1 & -4 & 2 \\ 1 & 2 & -1 \end{bmatrix}$.

(D) $\begin{bmatrix} 1 & -3 & 1 \\ 2 & -6 & 2 \end{bmatrix}$.



406 已知 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是齐次方程组 $Ax = 0$ 的基础解系, 则 $Ax = 0$ 的基础解系还可以是

- (A) 与 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 等价的向量组. (B) $\alpha_1 - \alpha_2, \alpha_2 - \alpha_3, \alpha_3 - \alpha_1$.
(C) 与 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 等秩的向量组. (D) $\alpha_1, \alpha_1 + \alpha_2, \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3$.



答案
区域



纠错
笔记

407 设 $A = [\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4]$ 是四阶矩阵, $\eta_1 = (1, -2, 3, 1)^T$ 和 $\eta_2 = (0, 1, 0, -2)^T$ 是 $Ax = 0$ 的基础解系, 则必有

- (A) $\alpha_1, \alpha_3, \alpha_4$ 线性无关. (B) α_2, α_4 线性无关.
(C) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关. (D) α_3, α_4 线性无关.



答案
区域



纠错
笔记

微信公众号【顶尖考研】
(ID: djky66)

408 设矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 4 & -3 & 3 \\ 2 & -1 & 1 \end{bmatrix}$, 那么矩阵 A 的三个特征值是

- (A) 1, 0, -2. (B) 1, 1, -3. (C) 3, 0, -2. (D) 2, 0, -3.



答案
区域



纠错
笔记

409 已知 A 是 n 阶可逆矩阵, 那么与 A 有相同特征值的矩阵是

- (A) A^T . (B) A^2 . (C) A^{-1} . (D) $A - E$.



410 设三阶矩阵 A 的特征值为 $1, 2, -1$, 则下列矩阵中可逆矩阵是

- (A) $A - E$. (B) $A + E$. (C) $A - 2E$. (D) $A + 2E$.



微信公众号【顶尖考研】
(ID: djky66)

411 矩阵 $A = \begin{bmatrix} 3 & -4 & -4 \\ 0 & 2 & 0 \\ 2 & -2 & -3 \end{bmatrix}$ 有一个特征向量是

- (A) $(1, 0, -1)^T$. (B) $(3, 3, -6)^T$. (C) $(4, -1, 2)^T$. (D) $(1, 1, -2)^T$.



本题有视频讲解哟, 答案册扫码。

微信公众号: 顶尖考研
(ID: djky66)

412

已知 $\alpha = (1, -2, 3)^T$ 是矩阵 $A = \begin{bmatrix} 3 & 2 & -1 \\ a & -2 & 2 \\ 3 & b & -1 \end{bmatrix}$ 的特征向量, 则

(A) $a = -2, b = 6$.

(B) $a = 2, b = -6$.

(C) $a = 2, b = 6$.

(D) $a = -2, b = -6$.



答案
区域



纠错
笔记

413

设 A 是 n 阶矩阵, 下列命题中正确的是

(A) 若 α 是 A^T 的特征向量, 那么 α 是 A 的特征向量.

(B) 若 α 是 A^* 的特征向量, 那么 α 是 A 的特征向量.

(C) 若 α 是 A^2 的特征向量, 那么 α 是 A 的特征向量.

(D) 若 α 是 $2A$ 的特征向量, 那么 α 是 A 的特征向量.



答案
区域



纠错
笔记

414

设 A 是三阶矩阵, 其特征值是 $1, 3, -2$, 相应的特征向量依次为 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$, 若 $P = [\alpha_1, 2\alpha_3, -\alpha_2]$, 则 $P^{-1}AP =$

(A) $\begin{bmatrix} 1 & & \\ & -2 & \\ & & 3 \end{bmatrix}$.

(B) $\begin{bmatrix} 1 & & \\ & -4 & \\ & & -3 \end{bmatrix}$.

(C) $\begin{bmatrix} 1 & & \\ & -2 & \\ & & -3 \end{bmatrix}$.


(D) $\begin{bmatrix} 1 & & \\ & 3 & \\ & & -2 \end{bmatrix}$.



答案
区域



纠错
笔记



415 设 A 是三阶矩阵, 特征值是 $2, 2, -5$. α_1, α_2 是 A 关于 $\lambda = 2$ 的线性无关的特征向量,

α_3 是 A 对应于 $\lambda = -5$ 的特征向量. 若 $P^{-1}AP = \begin{bmatrix} 2 & & \\ & 2 & \\ & & -5 \end{bmatrix}$, 则 P 不能是

(A) $[\alpha_2, -\alpha_1, \alpha_3]$.

(B) $[\alpha_1 + \alpha_2, 5\alpha_1, 2\alpha_3]$.

(C) $[\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_1 - \alpha_2, \alpha_3]$.

(D) $[\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3]$.



416 下列矩阵中, 不能相似对角化的是

(A) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 0 \\ 1 & 2 & 2 \end{bmatrix}$.

(B) $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$.

(C) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 3 & 2 & -1 \end{bmatrix}$.

(D) $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 0 & 1 \\ 3 & 1 & 1 \end{bmatrix}$.



417 下列矩阵中, A 和 B 相似的是

(A) $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}$.

(B) $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$.

(C) $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$.

(D) $A = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$.



418 已知 A 是 n 阶可逆矩阵,若 $A \sim B$,则下列命题中

- ① $AB \sim BA$, ② $A^2 \sim B^2$, ③ $A^{-1} \sim B^{-1}$, ④ $A^T \sim B^T$,

正确的命题共有

- (A) 4 个. (B) 3 个. (C) 2 个. (D) 1 个.



419 已知 A 是三阶矩阵, $r(A) = 1$, 则 $\lambda = 0$

- (A) 必是 A 的二重特征值. (B) 至少是 A 的二重特征值.
(C) 至多是 A 的二重特征值. (D) 一重、二重、三重特征值都有可能.



微信公众号【顶尖考研】
(ID: djky66)

420 已知二次型 $x_1^2 + 3x_2^2 + 5x_3^2 - 4x_1x_2 + 8x_2x_3$, 在下列矩阵运算中, 得到二次型的是

(A) $\mathbf{x}^T \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \\ -3 & 3 & 2 \\ -2 & 6 & 5 \end{bmatrix} \mathbf{x}.$

(B) $\mathbf{x}^T \begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 \\ -2 & 5 & 4 \\ 0 & 4 & 3 \end{bmatrix} \mathbf{x}.$

(C) $\mathbf{x}^T \begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 0 & 3 & 4 \\ -2 & 4 & 5 \end{bmatrix} \mathbf{x}.$

(D) $\mathbf{x}^T \begin{bmatrix} 1 & -2 & 4 \\ -2 & 3 & 0 \\ 4 & 0 & 5 \end{bmatrix} \mathbf{x}.$



421 二次型经正交变换标准形不是 $y_1^2 + 3y_2^2 - y_3^2$ 的是

(A) $3x_2^2 + 2x_1x_3$.

(B) $x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + 4x_1x_2$.

(C) $2x_1^2 + 2x_2^2 - x_3^2 + 2x_1x_2$.

(D) $x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 - 4x_1x_2 - 4x_2x_3$.



422 二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_3^2 - 2x_1x_2 - 2x_2x_3$ 的规范形是

(A) $z_1^2 + z_2^2 - z_3^2$.

(B) $z_2^2 - z_3^2$.

(C) $z_1^2 - z_2^2 - z_3^2$.

(D) $z_1^2 + z_2^2$.



微信公众号【顶尖考研】
(ID: djky66)

423 已知二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 + ax_2^2 + ax_3^2 - 4x_2x_3$ 的规范形是 $y_1^2 + y_2^2 - y_3^2$, 则 a 的取值

(A) $(-2, 2)$.

(B) 2 .

(C) $(2, +\infty)$.

(D) $(-\infty, -2)$.



424

下列矩阵中, 正定矩阵是

(A) $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 5 \\ 3 & 5 & 6 \end{bmatrix}$.

(B) $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 5 & 3 \\ 0 & 3 & 8 \end{bmatrix}$.

(C) $\begin{bmatrix} 2 & 2 & -2 \\ 2 & 5 & -4 \\ -2 & -4 & 5 \end{bmatrix}$.

(D) $\begin{bmatrix} 5 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \\ 1 & 3 & 0 \end{bmatrix}$.



答题
区域



纠错
笔记

微信公众号【顶尖考研】

425

已知 $A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$, 若 $A + kE$ 正定, 则 k 的取值范围是

(A) $k = 1$.

(B) $k > 1$.

(C) $k \geq 1$.

(D) $k \leq 1$.



答题
区域



纠错
笔记

概率论与数理统计

填空题

426 已知事件 A 与 B 相互独立, $P(A) = a, P(B) = b$. 如果事件 C 发生必然导致事件 A 与 B 同时发生, 则 A, B, C 都不发生的概率为 _____.

 答题区域

 纠错笔记

427 已知事件 A, B 仅发生一个的概率为 0.3, 且 $P(A) + P(B) = 0.5$, 则 A, B 至少有一个不发生的概率为 _____.

 答题区域

 纠错笔记

428 设随机事件 A, B, C 满足 $A \subset C, P(AB) = \frac{1}{2}$ 和 $P(C) = \frac{2}{3}$, 则 $P(\bar{A} \cup \bar{B} | C) =$ _____.

 答题区域

 纠错笔记

429

设随机事件 A, B 和 $A \cup B$ 的概率分别是 $0.4, 0.3$ 和 0.6 , 则事件 $A\bar{B}$ 的概率 $P(A\bar{B})$

=



430

已知甲袋有 3 个白球, 6 个黑球, 乙袋有 5 个白球, 4 个黑球. 先从甲袋中任取一球放入乙袋, 然后再从乙袋中任取一球放回甲袋, 则甲袋中白球数不变的概率为_____.



微信公众号【顶尖考研】
(ID: djky66)

431

一射手对同一目标独立地进行 4 次射击. 若至少命中一次的概率为 $\frac{15}{16}$, 则该射手对同一目标独立地进行 4 次射击中至少没命中一次的概率为_____.



432 将一枚硬币重复掷 5 次,则正、反面都至少出现 2 次的概率为_____.



433 某种产品由自动生产线进行生产,一旦出现不合格品就立即对其进行调整,经过调整后生产出的产品为不合格品的概率为 0.1. 那么两次调整之间至少生产 3 件产品的概率为_____.



微信公众号【顶尖考研】
(ID: djky66)

434 袋中有 8 个球,其中 3 个白球 5 个黑球,现随意从中取出 4 个球,如果 4 个球中有 2 个白球 2 个黑球,试验停止. 否则将 4 个球放回袋中,重新抽取 4 个球,直到出现 2 个白球 2 个黑球为止. 用 X 表示抽取次数,则 $P\{X = k\} = \underline{\hspace{2cm}}$ ($k = 1, 2, \dots$).



435 假设 X 服从参数为 λ 的指数分布,对 X 作 3 次独立重复观察,至少有一次观测值大于 2 的概率为 $\frac{7}{8}$,则 $\lambda =$ _____.

 答题区域

 纠错笔记

436 一实习生用同一台机器接连独立地制造 3 个同种零件,第 i 个零件是不合格品的概率 $p_i = \frac{1}{i+1} (i = 1, 2, 3)$,以 X 表示 3 个零件中合格品的个数,则 $P\{X = 2\} =$ _____.

 答题区域

 纠错笔记

微信公众号【顶尖考研】
(ID: djky66)

437 设随机变量 X 服从参数 1 的指数分布,则 $P\{3 > X > 2 \mid X > 1\} =$ _____.

 答题区域

 纠错笔记

15455-125578
(024)(06:00)

438 设袋中有黑、白球各 1 个, 从中有放回地取球, 每次取 1 个, 直到 2 种颜色球都取到时停止, 则取球次数恰好为 3 的概率为_____.



439 设随机变量 X_1 服从分布 $B(2, p)$, 随机变量 X_2 服从分布 $B(3, p)$. 已知 $P\{X_1 \geq 1\} = \frac{5}{9}$, 则 $P\{X_2 \geq 1\} =$ _____.



微信公众号【顶尖考研】
(ID: djky66)

440 设随机变量 X 服从 $(0, 2)$ 上的均匀分布, 则随机变量 $Y = X^2$ 在 $(0, 4)$ 内的概率分布密度 $f_Y(y) =$ _____.



微信公众号: 顶尖考研
(ID: djky66)

441 设随机变量 $X \sim N(\mu, \sigma^2) (\sigma > 0)$, 其分布函数为 $F(x)$, 则有 $F(\mu + x\sigma) + F(\mu - x\sigma) =$ _____.



本题有视频讲解哟, 答案册扫码.

442 设随机变量 X 服从参数为 1 的指数分布, 随机变量函数 $Y = 1 - e^{-X}$ 的分布函数为 $F_Y(y)$, 则 $F_Y\left(\frac{1}{2}\right) =$ _____.



微信公众号【顶尖考研】
(ID: djky66)

443 设相互独立的两随机变量 X 与 Y 均服从参数为 1 的指数分布, 则 $P\{\min(X, Y) \geq 1\} =$ _____.



顶尖考研 公众号
(ID: djky66)

444

设 $X \sim N(\mu, \sigma_1^2)$, $Y \sim N(2\mu, \sigma_2^2)$, X 与 Y 相互独立, 已知 $P\{X - Y \geq 1\} = \frac{1}{2}$, 则 $\mu =$



445

已知随机变量 (X, Y) 的概率密度函数 $f(x, y) = \begin{cases} e^{-y}, & 0 < x < y, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$,

则 $P\{X + Y \leq 1\} =$ _____.



微信公众号【顶尖考研】
(ID: djky66)

446

已知随机变量 X 的概率分布为 $P\{X = k\} = \frac{1}{3}, (k = 1, 2, 3)$, 当 $X = k$ 时随机变量 Y 在 $(0, k)$ 上服从均匀分布, 即

$$P\{Y \leq y \mid X = k\} = \begin{cases} 0, & y \leq 0 \\ \frac{y}{k}, & 0 < y < k, \\ 1, & k \leq y \end{cases}$$

则 $P\{Y \leq 2.5\} =$ _____.



447 设随机变量 X_1 和 X_2 相互独立, 已知 $X_1 \sim B(1, \frac{3}{4})$, X_2 的分布函数为 $F(x)$, 则随机变量 $Y = X_1 + X_2$ 的分布函数 $F_Y(y) =$ _____.



448 设随机变量 (X, Y) 服从分布律

$X \backslash Y$	0	1
0	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$
1	0	$\frac{1}{2}$

则 $F(\frac{1}{2}, 1) =$ _____.



449 已知 (X, Y) 的概率分布为

$X \backslash Y$	-1	0	1
0	0.1	0.2	α
1	β	0.1	0.2

则 $P\{X^2 Y^2 = 1\} =$ _____.



450 设随机变量 X 与 Y 相互独立, 且均服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, 则 $P\{\max(X, Y) > \mu\} - P\{\min(X, Y) < \mu\} =$ _____.



451 设相互独立两个随机变量 X 和 Y 均服从标准正态分布, 则随机变量 $X - Y$ 的概率密度函数的最大值等于 _____.



微信公众号【顶尖考研】
(ID: djky66)

452 设 $(X, Y) \sim N(\mu_1, \mu_2; \sigma_1^2, \sigma_2^2; 0)$, 其分布函数为 $F(x, y)$, 已知 $F(\mu_1, y) = \frac{1}{4}$, 则 $y =$ _____.



微信公众号: 顶尖考研
(ID: djky66)

453 设二维随机变量 (X, Y) 的分布函数为 $\Phi(2x+1)\Phi(2y-1)$, 其中 $\Phi(x)$ 为标准正态分布函数, 则 (X, Y) 服从正态分布 $N(\underline{\hspace{2cm}})$.



本题有视频讲解哟, 答案册扫码。

454 设随机变量 X 和 Y 相互独立, 且 X 服从标准正态分布, 其分布函数为 $\Phi(x)$, Y 的概率分布为 $P\{Y=-1\} = P\{Y=1\} = \frac{1}{2}$, 则随机变量 $Z = XY$ 的分布函数 $F(x) = \underline{\hspace{2cm}}$.



微信公众号【顶尖考研】
(ID: djky66)

455 设随机变量 X 的概率密度函数 $f(x) = \begin{cases} x, & a < x < b, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases} (a > 0)$, 其中 a, b 为待定常数, 且 $EX^2 = 2$, 则 $P\{|X| < \sqrt{2}\} = \underline{\hspace{2cm}}$.



456 已知随机变量 X_1 与 X_2 相互独立且分别服从参数为 λ_1, λ_2 的泊松分布, 已知 $P\{X_1 + X_2 > 0\} = 1 - e^{-1}$, 则 $E(X_1 + X_2)^2 =$ _____.

答题
区域

纠错
笔记

457 已知随机变量 X_1, X_2 相互独立, 且都服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2), (\sigma > 0)$, 则 $D(X_1 X_2) =$ _____.

答题
区域

纠错
笔记

微信公众号【顶尖考研】
(ID: djky66)

458 设随机变量 X 的分布律为 $P\{X = k\} = \frac{1}{2^k k! (\sqrt{e} - 1)}, k = 1, 2, \dots$, 则 X 的数学期望 $E(X) =$ _____.

答题
区域

纠错
笔记

459

相互独立的随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 具有相同的方差 $\sigma^2 > 0$, 记 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$, 则 $D(X_i - \bar{X}) =$ _____.



460

设随机变量 X 和 Y 均服从 $B(1, \frac{1}{2})$, 且 $D(X+Y) = 1$, 则 X 与 Y 的相关系数 $\rho =$ _____.



微信公众号【顶尖考研】
(ID: djky66)

461

设随机变量 X 服从分布 $E(1)$, 记 $Y = \min\{|X|, 1\}$, 则 Y 的数学期望 $E(Y) =$ _____.



462 设连续型随机变量 X 的分布函数 $F(x) = \begin{cases} a - e^{-bx}, & x > 0 \\ c, & x \leq 0 \end{cases}$. 已知 $E(X) = 1$, 则 $D(X) =$ _____.

答题
区域

纠错
笔记

463 相互独立的随机变量 X_1 和 X_2 均服从正态分布 $N(0, \frac{1}{2})$, 则 $D(|X_1 - X_2|) =$ _____.

答题
区域

纠错
笔记

微信公众号【顶尖考研】
(ID: djky66)

464 已知二维随机变量 $(X, Y) \sim N(\mu_1, \mu_2; \sigma_1^2, \sigma_2^2; \rho)$ ($\sigma_1 > 0, \sigma_2 > 0$), 则二维随机变量 $(\frac{X - \mu_1}{\sigma_1}, Y) \sim$ _____.

答题
区域

纠错
笔记

微信公众号: 顶尖考研
(ID: djky66)

465 设随机变量 X 服从参数为 λ 的泊松分布, 且已知 $E[(X-1)(X-2)] = 1$, 则 $\lambda =$ _____.




466 设随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n (n > 1)$ 独立同分布, 且方差为 $\sigma^2 > 0$, 记 $Y_1 = \sum_{i=2}^n X_i$ 和 $Y_n = \sum_{j=1}^{n-1} X_j$, 则 Y_1 和 Y_n 的协方差 $\text{Cov}(Y_1, Y_n) =$ _____.



微信公众号【顶尖考研】
(ID: djky66)

467 设随机变量 X 在 $[-1, b]$ 上服从均匀分布, 其中 b 是未知常数, 根据切比雪夫不等式有 $P\{|X-1| \geq \epsilon\} \leq \frac{1}{3}$, 则 $\epsilon =$ _____.



468 将一个骰子重复掷 n 次, 各次掷出的点数依次为 $X_1, \dots, X_n$. 则当 $n \rightarrow \infty$ 时,

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \text{ 依概率收敛于 } \underline{\hspace{2cm}}.$$

 答题
区域

 纠错
笔记

469 设随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_{2n}, \dots$ 独立均服从指数分布 $E(\lambda)$, 记 $Z_i = X_{2i} - X_{2i-1}, i = 1, 2, 3, \dots$, 则 $\sum_{i=1}^n Z_i$ 近似服从正态分布 $N(\underline{\hspace{2cm}}, \underline{\hspace{2cm}})$.

 答题
区域

 纠错
笔记

微信公众号【顶尖考研】
(ID: djky66)

470 设相互独立的随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 均服从标准正态分布, 记 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$, 则随机变量 $X_1 - \bar{X}$ 服从的分布及参数为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

 答题
区域

 纠错
笔记

471 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为取自总体 X 的简单随机样本, 已知总体 X 的分布为 $F(x)$, 则 $Y = \max(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 的分布函数 $F_Y(y) =$ _____.



472 已知 (X, Y) 的概率密度函数为

$$f(x, y) = \frac{1}{2\pi} e^{-\frac{1}{2}(x^2 + y^2 - 2y + 1)}, -\infty < x, y < +\infty,$$

则 $\frac{X^2}{(Y-1)^2}$ 服从的分布及参数为_____.



微信公众号【顶尖考研】
(ID: djky66)

473 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本, 而 $X \sim B\left(1, \frac{1}{2}\right)$. 记 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$,

则 $P\left\{\bar{X} = \frac{k}{n}\right\} =$ _____. ($0 \leq k \leq n$)



474 设总体 X 的概率密度函数为 $f(x) = \frac{1}{2}e^{-|x-\mu|} (-\infty < x < +\infty)$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为总体 X 的简单随机样本, 其样本方差为 S^2 , 则 $E(S^2) =$ _____.



475 设随机变量 $X \sim t(n)$, $Y \sim F(1, n)$, 常数 C 满足 $P\{X > C\} = 0.6$, 则 $P\{Y > C^2\} =$ _____.



微信公众号【顶尖考研】
(ID: djky66)

476 设 $X_1, X_2, \dots, X_6$ 是来自正态分布 $N(0, \sigma^2)$ 的简单随机样本. 统计量 $F = a \frac{X_1^2 + X_2^2}{X_3^2 + X_4^2 + X_5^2 + X_6^2}$ 服从 $F(n_1, n_2)$ 分布, 其中 a 为常数, 则参数 n_1 和 n_2 分别为 _____.



微信公众号: 顶尖考研
(ID: djky66)

477 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 $E(\lambda) (\lambda > 0)$ 的简单随机样本, 记统计量 $T = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2$, 则 $ET =$ _____.

 答题区域

 纠错笔记

478 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自指数分布总体 $E(\lambda)$ 的简单随机样本, $\bar{X}$ 和 S^2 分别为样本均值和样本方差. 记统计量 $T = \bar{X} - S^2$, 则 $ET =$ _____.

 答题区域

 纠错笔记

微信公众号【顶尖考研】
(ID: djky66)

479 设总体 X 的概率分布为

X	0	1	2
P	θ^2	$2\theta(1-\theta)$	$(1-\theta)^2$

其中

$\theta (0 < \theta < \frac{1}{2})$ 是未知参数, 利用总体 X 的如下样本值 1, 2, 1, 0, 1, 0, 1, 2, 1, 2, 则有 θ 的矩估计值为 _____.

 答题区域

 纠错笔记

顶尖考研: 公众号
(ID: djky66)

480 设 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 为来自总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的样本值, 其平均值 $\bar{x} = 9.0$, 参数 μ 的置信度为 0.90 的双侧置信区间的置信下限为 7.8, 则 μ 的置信度为 0.90 的双侧置信上限为_____.

 答题
区域

 纠错
笔记

481 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自区间 $[-a, a]$ 上均匀分布的总体 X 的简单随机样本, 则参数 a 的矩估计量为_____.

 答题
区域

 纠错
笔记

微信公众号【顶尖考研】
(ID: djky66)

482 设随机变量 X 在区间 $[0, \theta]$ 上服从均匀分布, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本, 则 θ 的最大似然估计量 $\hat{\theta} =$ _____.

 答题
区域

 纠错
笔记

483 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本, X 的概率密度函数为 $f(x) = \frac{1}{2\lambda} e^{-\frac{|x|}{\lambda}}$,

$-\infty < x < +\infty, \lambda > 0$, 则 λ 的最大似然估计量 $\hat{\lambda} =$ _____.

答题
区域

纠错
笔记

484 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本, 据此样本检测在检验水平 α 条件下的拒绝域范围会随 α 变大而变_____.

答题
区域

纠错
笔记

微信公众号【顶尖考研】
(ID: djky66)

485 设 $X_1, X_2, \dots, X_{36}$ 是取自正态总体 $N(\mu, 0.04)$ 的简单随机样本, 其中 μ 为未知参数,

记 $\bar{X} = \frac{1}{36} \sum_{i=1}^{36} X_i$, 如果对检验问题

$$H_0: \mu \leq 0.5, H_1: \mu > 0.5$$

在显著性水平 $\alpha = 0.05$, 取检验拒绝域 $D = \{(x_1, x_2, \dots, x_{36}) : \bar{x} > C\}$, 则 $C =$ _____.
($\Phi(1.645) = 0.95$)

答题
区域

纠错
笔记

选 择 题

486 设随机事件 A 和 B 满足关系式 $A \cup B = \bar{A} \cup \bar{B}$, 则必有

- (A) $A - B = \emptyset$. (B) $AB = \emptyset$. (C) $AB \cup \bar{A}\bar{B} = \Omega$. (D) $A \cup \bar{B} = \Omega$.



487 设随机事件 A 与 B 相互独立, 且 $P(A - B) = 0.3$, $P(B) = 0.4$, 则 $P(B - A) =$

- (A) 0.1. (B) 0.2. (C) 0.3. (D) 0.4.



微信公众号【顶尖考研】
(ID: djky66)

488 将一枚硬币独立投掷二次, 记事件 $A =$ “第一次掷出正面”, $B =$ “第二次掷出反面”, $C =$ “正面最多掷出一次”, 则事件

- (A) A, B, C 两两独立. (B) A 与 BC 独立.
(C) B 与 AC 独立. (D) C 与 AB 独立.



489 已知 A, B 为随机事件, $0 < P(A) < 1, 0 < P(B) < 1$, 则 $P(\bar{A} | B) = P(B | \bar{A})$ 充要条件是

(A) $P(B | A) = P(B | \bar{A})$.

(B) $P(A | B) = P(A | \bar{B})$.

(C) $P(\bar{B} | A) = P(A | \bar{B})$.

(D) $P(A | B) = P(\bar{A} | B)$.



答案
区域



纠错
笔记 本题有视频讲解哟, 答案册扫码。

490 设事件 A, B, C 两两独立, 则 A, B, C 相互独立的充分必要条件是

(A) AB 和 BC 独立.

(B) $A \cup B$ 和 $B \cup C$ 独立.

(C) $A - B$ 和 C 独立.

(D) $A - B$ 和 $B - C$ 独立.



答案
区域



纠错
笔记

491 设随机事件 A 与 B 互不相容, 则

(A) $P(\bar{A} \bar{B}) = 0$.

(B) $P(\bar{A} \bar{B}) \neq 0$.

(C) $P(A \cup \bar{B}) = P(A)$.

(D) $P(A \cup \bar{B}) = P(\bar{B})$.



答案
区域



纠错
笔记

492 对任意两个互不相容的事件 A 与 B , 必有

- (A) 如果 $P(A) = 0$, 则 $P(B) = 0$. (B) 如果 $P(A) = 0$, 则 $P(B) = 1$.
(C) 如果 $P(A) = 1$, 则 $P(B) = 0$. (D) 如果 $P(A) = 1$, 则 $P(B) = 1$.

答题
区域

纠错
笔记

493 设 A, B 为随机事件, $P(B) > 0$, 则

- (A) $P(A \cup B) \geq P(A) + P(B)$. (B) $P(A - B) \geq P(A) - P(B)$.
(C) $P(AB) \geq P(A)P(B)$. (D) $P(A|B) \geq \frac{P(A)}{P(B)}$.

答题
区域

纠错
笔记

微信公众号【顶尖考研】
(ID: djky66)

494 设随机事件 A, B , 满足 $P(A) > 0, P(B|A) = 1$, 则

- (A) $B = \Omega$. (B) $A - B = \emptyset$.
(C) $P(A - B) = 0$. (D) $P(B - A) = 0$.

答题
区域

纠错
笔记

微信公众号: 顶尖考研
(ID: djky66)

495 已知 $0 < P(B) < 1$ 且 $P[(A_1 \cup A_2) | B] = P(A_1 | B) + P(A_2 | B)$, 则成立

(A) $P[(A_1 \cup A_2) | \bar{B}] = P(A_1 | \bar{B}) + P(A_2 | \bar{B})$.

(B) $P(A_1 B \cup A_2 B) = P(A_1 B) + P(A_2 B)$.

(C) $P(A_1 \cup A_2) = P(A_1 | B) + P(A_2 | B)$.

(D) $P(B) = P(A_1)P(B | A_1) + P(A_2)P(B | A_2)$.



答案
区域



纠错
笔记

496 若 A, B 为任意两个随机事件, 且满足条件 $P(AB) \geq \frac{P(A) + P(B)}{2}$, 则

(A) $A = B$.

(B) A, B 互不相容.

(C) $P(AB) = P(A)P(B)$.

(D) $P(A - B) = 0$.



答案
区域



纠错
笔记

497 设离散型随机变量 X 服从分布律 $P\{X = k\} = \frac{C}{k!} e^{-2}, k = 0, 1, 2, \dots$ 则常数 C 必为

(A) 1.

(B) e .

(C) e^{-1} .


(D) e^{-2} .



答案
区域



纠错
笔记



498 设随机变量 X 在 $[0,1]$ 上服从均匀分布, 记事件 $A = \left\{0 \leq X \leq \frac{1}{2}\right\}, B = \left\{\frac{1}{4} \leq X \leq \frac{3}{4}\right\}$, 则

(A) A 与 B 互斥, 但不对立.

(B) B 包含 A .

(C) A 与 B 对立.

(D) A 与 B 相互独立.



499 假设随机变量 X 的概率密度函数 $f(x)$ 是偶函数, 其分布函数为 $F(x)$, 则

(A) $F(x)$ 是偶函数.

(B) $F(x)$ 是奇函数.

(C) $F(x) + F(-x) = 1$.

(D) $2F(x) - F(-x) = 1$.



微信公众号【顶尖考研】
(ID: djky66)

500 假设随机变量 X 的分布函数为 $F(x)$, 概率密度函数 $f(x) = af_1(x) + bf_2(x)$, 其中 $f_1(x)$ 是正态分布 $N(0, \sigma^2)$ 的概率密度函数, $f_2(x)$ 是参数为 λ 的指数分布的概率密度函数, 已知 $F(0) = \frac{1}{8}$, 则

(A) $a = 1, b = 0$.

(B) $a = \frac{3}{4}, b = \frac{1}{4}$.

(C) $a = \frac{1}{2}, b = \frac{1}{2}$.

(D) $a = \frac{1}{4}, b = \frac{3}{4}$.



501 设随机变量 X 的分布函数为 $F(x)$

- (A) 当 $x < a$ 时 $F(x) = 0$, 则 $F(a) = 0$.
 (B) 当 $x > a$ 时 $F(x) = 1$, 则 $F(a) = 1$.
 (C) 当 $P\{X < a\} = \frac{1}{2}$ 时, 则 $F(a) = \frac{1}{2}$.
 (D) 当 $P\{X \geq a\} = \frac{1}{2}$ 时, 则 $F(a) = \frac{1}{2}$.



502 设随机变量 X 的概率密度函数 $f(x)$ 满足 $f(1+x) = f(1-x)$, 且 $\int_1^2 f(x) dx = 0.3$, 则 X 的分布函数 $F(x)$ 有 $F(0) =$
 (A) 0.2. (B) 0.3. (C) 0.4. (D) 0.5.



503 设随机变量 X 的分布函数为 $F(x)$, 则可以作出分布函数

- (A) $F(ax)$. (B) $F(x^2 + 1)$. (C) $F(x^3 - 1)$. (D) $F(|x|)$.



504

 设随机变量 X 的概率密度函数为 $f(x)$, 则可以作出函数密度函数

- (A) $f(2x)$. (B) $f(2-x)$. (C) $f^2(x)$. (D) $f(x^2)$.



505

 设随机变量 $X \sim U(a, b)$, 已知 $P\{-2 < X < 0\} = \frac{1}{4}$ 和 $P\{1 < X < 3\} = \frac{1}{2}$. 则

- (A) $\begin{cases} a = -2 \\ b = 2 \end{cases}$. (B) $\begin{cases} a = -2 \\ b = 3 \end{cases}$.
 (C) $\begin{cases} a = -1 \\ b = 3 \end{cases}$. (D) $\begin{cases} a = -1 \\ b = 2 \end{cases}$.



506

 设随机变量 X 的分布函数和概率密度函数分别为 $F(x)$ 和 $f(x)$, 则随机变量 $-X$ 的分布函数和概率密度函数分别为

- (A) $F(-x)$ 和 $f(-x)$. (B) $F(-x)$ 和 $f(x)$.
 (C) $1 - F(-x)$ 和 $f(-x)$. (D) $1 - F(-x)$ 和 $f(x)$.



微信公众号: 顶尖考研
(ID: djky66)

507 连续型随机变量 X 的分布函数 $F(x) = \begin{cases} a + be^{-x}, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$, 则其中的常数 a 和 b 为

- (A) $\begin{cases} a = 1, \\ b = 1. \end{cases}$ (B) $\begin{cases} a = 1, \\ b = -1. \end{cases}$ (C) $\begin{cases} a = -1, \\ b = 1. \end{cases}$ (D) $\begin{cases} a = 0, \\ b = 1. \end{cases}$



508 设随机变量 X 的概率密度函数为 $f(x) = \begin{cases} e^{-x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$, 则 $P\{X \leq 2 | X \geq 1\}$ 的值为

- (A) e^{-2} . (B) $1 - e^{-2}$. (C) e^{-1} . (D) $1 - e^{-1}$.



微信公众号【顶尖考研】
(ID: djky66)

509 已知 $X \sim N(15, 4)$, 若 X 的值落入区间 $(-\infty, x_1), (x_1, x_2), (x_2, x_3), (x_3, x_4), (x_4, +\infty)$ 内的概率之比为 $7:24:38:24:7$, 则 x_1, x_2, x_3, x_4 分别为

- (A) 12, 13.5, 16.5, 18. (B) 11.5, 13.5, 16.5, 18.5.
(C) 12, 14, 16, 18. (D) 11, 14, 16, 19.

附: 标准正态分布函数值 $\Phi(1.5) = 0.93, \Phi(0.5) = 0.69$.



510 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x)$, 则随机变量 $2X+3$ 的概率密度函数为

(A) $\frac{1}{2}f\left(\frac{x-3}{2}\right)$.

(B) $f\left(\frac{x-3}{2}\right)$.

(C) $2f(2x+3)$.

(D) $f(2x+3)$.



511 设随机变量 X 与 Y 相互独立, X 服从参数为 λ 的指数分布, Y 的分布律为

Y	-1	1
P	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$

, 则 $Z = X + Y$ 的分布函数 $F_Z(z)$

(A) 是连续函数.

(B) 是恰有一个间断点的阶梯函数.

(C) 是恰有一个间断点的非阶梯函数.

(D) 至少有两个间断点.



(ID: djky66)

512 设随机变量 (X, Y) 的分布函数为 $F(x, y)$, 边缘分布为 $F_X(x)$ 和 $F_Y(y)$, 则概率 $P\{X > x, Y > y\}$ 等于

(A) $1 - F(x, y)$.

(B) $1 - F_X(x) - F_Y(y)$.

(C) $F(x, y) - F_X(x) - F_Y(y) + 1$.

(D) $F_X(x) + F_Y(y) + F(x, y) - 1$.



微信公众号: 顶尖考研
(ID: djky66)

513 设相互独立的随机变量 X_i 的分布函数为 $F_i(x)$, 概率密度函数为 $f_i(x), i = 1, 2$, 则随机变量 $Y = \max(X_1, X_2)$ 的概率密度函数为

- (A) $f_1(x)f_2(x)$. (B) $f_1(x) + f_2(x)$.
(C) $f_1(x)F_1(x) + f_2(x)F_2(x)$. (D) $f_1(x)F_2(x) + f_2(x)F_1(x)$.



514 假设随机变量 X 与 Y 相互独立且都服从参数为 λ 的指数分布, 则可以作出服从参数为 2λ 的指数分布的随机变量如


- (A) $X + Y$. (B) $X - Y$. (C) $\max(X, Y)$. (D) $\min(X, Y)$.



微信公众号【顶尖考研】
(ID: djky66)

515 设随机变量 X 和 Y 相互独立同分布. 已知 $P\{X = k\} = pq^{k-1} (k = 1, 2, 3, \dots)$ 其中 $0 < p < 1, q = 1 - p$, 则 $P\{X = Y\}$ 等于

- (A) $\frac{p}{2-p}$. (B) $\frac{1-p}{2-p}$. (C) $\frac{p}{1-p}$. (D) $\frac{2p}{1-p}$.



516 已知随机变量 X 与 Y 相互独立且都服从正态分布 $N(\mu, \frac{1}{2})$, 如果 $P\{X+Y \leq 1\} = \frac{1}{2}$, 则 μ 等于

- (A) -1 . (B) 0 . (C) $\frac{1}{2}$. (D) 1 .



517 设随机变量 (X, Y) 的概率密度函数 $f(x, y) = \frac{1}{2\pi} e^{-\frac{x^2+y^2}{2}}$, $-\infty < x, y < +\infty$, 则在 $Y = y$ 的条件下, X 的条件概率密度函数 $f_{X|Y}(x|y)$ 为

- (A) $\frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}$, $-\infty < x < +\infty$.
 (B) $\frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{y^2}{2}}$, $-\infty < y < +\infty$.
 (C) $\frac{1}{2\sqrt{2\pi}} (e^{-\frac{x^2}{2}} + e^{-\frac{y^2}{2}})$, $-\infty < x, y < +\infty$.
 (D) $\frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-y)^2}{2}}$, $-\infty < x, y < +\infty$.



本题有视频讲解哟, 答案册扫码。

518 设随机变量 X 和 Y 相互独立, 均服从分布 $B(1, \frac{1}{2})$, 则成立

- (A) $P\{X = Y\} = 1$. (B) $P\{X = Y\} = \frac{1}{2}$.
 (C) $P\{X = Y\} = \frac{1}{4}$. (D) $P\{X = Y\} = 0$.



519

设随机变量 $X_i \sim \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{2} & \frac{1}{4} \end{pmatrix} (i=1,2)$ 且满足条件 $P\{X_1 + X_2 = 0\} = 1$, 则 $P\{X_1 = X_2\}$ 等于

- (A) 0. (B) $\frac{1}{4}$. (C) $\frac{1}{2}$. (D) 1.



520

设 (X,Y) 具有概率密度函数 $f(x,y) = \frac{1 + \sin x \sin y}{2\pi} e^{-\frac{x^2+y^2}{2}}$, 则

- (A) (X,Y) 服从二维正态, 且 X 与 Y 均服从一维正态分布.
 (B) (X,Y) 服从二维正态, 但 X 与 Y 均不服从一维正态分布.
 (C) (X,Y) 不服从二维正态, 且 X 与 Y 均不服从一维正态分布.
 (D) (X,Y) 不服从二维正态, 但 X 与 Y 均服从一维正态分布.



521

设二维随机变量 (X,Y) 与 (U,V) 有相同的边缘分布, 则

- (A) (X,Y) 与 (U,V) 有相同的联合分布.
 (B) (X,Y) 与 (U,V) 不一定有相同的联合分布.
 (C) $(X+Y)$ 与 $(U+V)$ 有相同的分布.
 (D) $(X-Y)$ 与 $(U-V)$ 有相同的分布.



522 设随机变量 (X, Y) 的分布函数为 $F(x, y)$, 则概率 $P\{X > a, Y > b\}$ 等于

- (A) $1 - F(a, b)$.
 (B) $1 - F(a, +\infty) - F(+\infty, b)$.
 (C) $F(a, b) - F(a, +\infty) - F(+\infty, b) + 1$.
 (D) $F(a, b) + F(a, +\infty) + F(+\infty, b) - 1$.

答题
区域

纠错
笔记

523 设相互独立的两随机变量 X 和 Y , 其中 $X \sim B\left(1, \frac{1}{2}\right)$, 而 Y 具有概率密度函数

$f(y) = \begin{cases} 1, & 0 \leq y < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, 则 $P\{X + Y \leq \frac{1}{3}\}$ 的值为

- (A) $\frac{1}{6}$. (B) $\frac{1}{3}$. (C) $\frac{1}{4}$. (D) $\frac{1}{2}$.

答题
区域

纠错
笔记

524 设相互独立的两随机变量 X 和 Y 均服从分布 $B\left(1, \frac{1}{3}\right)$, 则 $P\{X \leq 2Y\} =$

- (A) $\frac{1}{9}$. (B) $\frac{4}{9}$. (C) $\frac{5}{9}$. (D) $\frac{7}{9}$.

答题
区域

纠错
笔记

525 设随机变量 X, Y 独立同分布, 且 X 的分布函数为 $F(x)$, 则 $Z = \min(X, Y)$ 的分布函数为

(A) $F^2(x)$.

(B) $F(x)F(y)$.

(C) $1 - [1 - F(x)]^2$.

(D) $[1 - F(x)][1 - F(y)]$.



526 设二维随机变量 (X_1, X_2) 的概率密度函数 $f_1(x_1, x_2)$, 则随机变量 (Y_1, Y_2) (其中 $Y_1 = 2X_1, Y_2 = \frac{1}{3}X_2$) 的概率密度函数 $f_2(y_1, y_2)$ 等于

(A) $f_1\left(\frac{y_1}{2}, 3y_2\right)$.

(B) $\frac{3}{2}f_1\left(\frac{y_1}{2}, 3y_2\right)$.

(C) $f_1\left(2y_1, \frac{y_2}{3}\right)$.

(D) $\frac{2}{3}f_1\left(2y_1, \frac{y_2}{3}\right)$.



527 设相互独立的两随机变量 X, Y 均服从 $[0, 3]$ 上的均匀分布, 则 $P\{1 < \max(X, Y) \leq 2\}$ 的值为

(A) $\frac{1}{6}$.

(B) $\frac{1}{4}$.

(C) $\frac{1}{3}$.

(D) $\frac{1}{2}$.



528 设相互独立的两随机变量 X 和 Y 分别服从 $E(\lambda)$ 和 $E(\lambda + 2)$ 分布, $\lambda > 0$, 则 $P\{\min(X, Y) > 1\}$ 的值为

- (A) $e^{-(\lambda+1)}$. (B) $1 - e^{-(\lambda+1)}$. (C) $e^{-2(\lambda+1)}$. (D) $1 - e^{-2(\lambda+1)}$.



529 设随机变量 X 服从参数为 λ 的泊松分布, 则 $E(X)E\left(\frac{1}{1+X}\right) =$

- (A) 1. (B) $e^{-\lambda}$. (C) $1 - e^{-\lambda}$. (D) $1 + e^{-\lambda}$.



微信公众号【顶尖考研】
(ID: djky66)

530 设随机变量 X, Y 不相关, 且 $EX = 2, EY = 1, DX = 3$, 则 $E[X(X + Y - 2)] =$

- (A) -3. (B) 3. (C) -5. (D) 5.



微信公众号: 顶尖考研
(ID: djky66)

531 设随机变量 X 的二阶矩存在,则

(A) $EX^2 < EX$.

(B) $EX^2 \geq EX$.

(C) $EX^2 < (EX)^2$.

(D) $EX^2 \geq (EX)^2$.



532 设随机变量 X 的期望、方差都存在,则对任意常数 c ,有

(A) $E(X-c)^2 < DX + [E(X-c)]^2$. (B) $E(X-c)^2 > DX + [E(X-c)]^2$.

(C) $E(X-c)^2 = DX + [E(X-c)]^2$. (D) $E(X-c)^2 = DX - [E(X-c)]^2$.



微信公众号【顶尖考研】
(ID: djky66)

533 设随机变量 X 的概率密度函数为 $f(x)$,则其数学期望 $E(X) = a$ 成立的话,则

(A) $\int_{-\infty}^{+\infty} xf(x-a)dx = 0$.

(B) $\int_{-\infty}^{+\infty} xf(x+a)dx = 0$.

(C) $\int_{-\infty}^a f(x)dx = \frac{1}{2}$.

(D) $\int_{-\infty}^a xf(x)dx = \frac{1}{2}$.



534

 设随机变量 X 的概率密度函数为 $f(x)$, 数学期望 $E(X) = 2$, 则

(A) $\int_{-\infty}^2 xf(x)dx = \frac{1}{2}$.

(B) $\int_{-\infty}^2 xf(x)dx = \int_2^{+\infty} xf(x)dx$.

(C) $\int_{-\infty}^2 f(x)dx = \frac{1}{2}$.

(D) $\int_{-\infty}^{+\infty} xf(2x)dx = \frac{1}{2}$.

 答案
区域

 纠错
笔记

535

 设随机变量 X 的分布函数为 $F(x) = 0.4\Phi\left(\frac{x-5}{2}\right) + 0.6\Phi\left(\frac{x+1}{3}\right)$, 其中 $\Phi(x)$ 为标准正态分布的分布函数, 则 $E(X) =$

(A) 3.

(B) 2.6.

(C) 1.4.

(D) 1.

 答案
区域

 纠错
笔记

536

 已知随机变量 X 的概率密度函数为 $f(x) = \frac{1}{2}e^{-|x|}$, $-\infty < x < +\infty$, 则 $D(X^2)$ 的值为

(A) 20.

(B) 22.

(C) 24.

(D) 28.

 答案
区域

 纠错
笔记

 微信公众号: 顶尖考研
(ID: djky66)

537

设随机变量 X 服从标准正态分布 $N(0,1)$, 则 $E[(X-2)^2 e^{2X}] =$

(A) 1.

(B) 2.

(C) e^2 .

(D) $2e^2$.



538

设随机变量 X 与 Y 相互独立, 均服从正态 $N(1,2)$, 则 $D(XY) =$

(A) 4.

(B) 6.

(C) 8.

(D) 10.



微信公众号【顶尖考研】
(ID: djky66)

539

已知随机变量 X 与 Y 的相关系数为 ρ_{XY} 且 $\rho_{XY} \neq 0$, 设 $Z = aX + b$, 其中 a, b 为常数, 则 Y 与 Z 的相关系数 $\rho_{YZ} = \rho_{XY}$ 的充要条件是

(A) $a = 1$.

(B) $a > 0$.

(C) $a < 0$.

(D) $a \neq 0$.



540 设二维随机变量 (X_1, X_2) 中 X_1 与 X_2 的相关系数为 ρ , 记 $\sigma_{ij} = \text{Cov}(X_i, X_j), (i, j = 1, 2)$, 则行列式

$$\begin{vmatrix} \sigma_{11} & \sigma_{12} \\ \sigma_{21} & \sigma_{22} \end{vmatrix} = 0$$

的充分必要条件是

- (A) $\rho = 0$. (B) $|\rho| = \frac{1}{3}$. (C) $|\rho| = \frac{1}{2}$. (D) $|\rho| = 1$.

答案区域

纠错笔记

541 已知随机变量 X 与 Y 有相同的不为零的方差, 则 X 与 Y 相关系数等于 1 的充分必要条件是

- (A) $\text{Cov}(X+Y, X) = 0$. (B) $\text{Cov}(X+Y, Y) = 0$.
(C) $\text{Cov}(X+Y, X-Y) = 0$. (D) $\text{Cov}(X-Y, X) = 0$.

答案区域

纠错笔记

542 已知随机变量 X 与 Y 的相关系数大于零, 则

- (A) $D(X+Y) > DX + DY$. (B) $D(X+Y) < DX + DY$.
(C) $D(X-Y) > DX + DY$. (D) $D(X-Y) < DX + DY$.

答案区域

纠错笔记

微信公众号: 顶尖考研
(ID: djky66)

543 设随机变量 X 与 Y 相互独立,且方差 $DX > 0, DY > 0$, 则

- (A) X 与 $X+Y$ 一定相关. (B) X 与 $X+Y$ 一定不相关.
(C) X 与 XY 一定相关. (D) X 与 XY 一定不相关.



544 设随机变量 X 的 $EX = \mu, DX = \sigma^2 (\sigma > 0 \text{ 为常数})$, 则对任意常数 c 必有

- (A) $E(X-c)^2 = EX^2 - c^2$. (B) $E(X-c)^2 = E(X-\mu)^2$.
(C) $E(X-c)^2 < E(X-\mu)^2$. (D) $E(X-c)^2 \geq E(X-\mu)^2$.



微信公众号【顶尖考研】
(ID: djky66)

545 设随机变量 X 的分布函数为 $F(x) = \begin{cases} a - e^{-bx}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$, 其中 a, b 均为常数. 已知

$D(X) = 4$, 则

- (A) $\begin{cases} a = 1 \\ b = 2 \end{cases}$ (B) $\begin{cases} a = 1 \\ b = \frac{1}{2} \end{cases}$ (C) $\begin{cases} a = 2 \\ b = 4 \end{cases}$ (D) $\begin{cases} a = 2 \\ b = \frac{1}{4} \end{cases}$



顶尖考研: 公众号: djky66
(ID: djky66)

546 已知随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立且 $EX_i = \mu, DX_i = \sigma^2 > 0$, 记 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$, 则

$X_1 - \bar{X}$ 与 $X_2 - \bar{X}$

- (A) 不相关且相互独立. (B) 不相关且相互不独立.
(C) 相关且相互独立. (D) 相关且相互不独立.



547 假设随机变量 X 与 Y 相互独立具有非零的方差, $DX \neq DY$, 则

- (A) $3X+1$ 与 $4Y-2$ 相关. (B) $X+Y$ 与 $X-Y$ 不相关.
(C) $X+Y$ 与 $2Y+1$ 相互独立. (D) e^X 与 $2Y+1$ 相互独立.



微信公众号【顶尖考研】
(ID: djky66)

548 已知随机变量 X 与 Y 均服从 $B\left(1, \frac{3}{4}\right)$ 分布, $EXY = \frac{5}{8}$, 则 $P\{X+Y \leq 1\}$ 等于

- (A) $\frac{1}{8}$. (B) $\frac{1}{4}$. (C) $\frac{3}{8}$. (D) $\frac{1}{2}$.



549 相互独立同分布的两个随机变量 X_1 和 X_2 , 已知

X_1	n	$n+1$	$n+2$
P	0.3	0.4	0.3

则 $D(X_1 + X_2) =$

(A) 1.2.

(B) 1.0.

(C) 0.8.

(D) 0.6.



550 将一枚硬币重复掷 2 次, 以 X 和 Y 分别表示正面向上和反面向上的次数, 则 X 和 Y 的相关系数等于

(A) -1 .

(B) 0 .

(C) $\frac{1}{2}$.

(D) 1 .



551 设随机变量 X 服从指数分布 $E(1)$, 用切比雪夫不等式得到估计 $P\{X \geq 3\} \leq a$, 则 $a =$

(A) $\frac{1}{2}$.

(B) $\frac{1}{4}$.

(C) $\frac{1}{8}$.

(D) e^{-3} .



552

 设随机变量序列 $X_1, \dots, X_n, \dots$ 相互独立, 则根据辛钦大数定律, 当 $n \rightarrow \infty$ 时,

 $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ 依概率收敛其数学期望, 只要随机变量序列 $X_1, \dots, X_n, \dots$

- (A) 有相同的数学期望. (B) 服从同一离散型分布.
(C) 服从同一泊松分布. (D) 服从同一连续型分布.

 答案
区域

 纠错
笔记

553

 设两两相互独立的随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ 必服从切比雪夫大数定律, 如果 $X_i, i = 1, 2, \dots$

- (A) 有相同数学期望.
(B) 服从同一离散型分布.
(C) 服从同一连续型分布.
(D) X_{2i} 服从泊松分布 $P(\lambda_2)$, X_{2i-1} 服从泊松分布 $P(\lambda_1) (i = 1, 2, \dots), \lambda_1, \lambda_2 > 0$.

 答案
区域

 纠错
笔记

554

 设 X_n 表示将一硬币随意投掷 n 次“正面”出现的次数, 则

- (A) $\lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\frac{X_n - n}{\sqrt{n}} \leq x\right\} = \Phi(x).$ (B) $\lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\frac{X_n - 2n}{\sqrt{n}} \leq x\right\} = \Phi(x).$
(C) $\lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\frac{2X_n - n}{\sqrt{n}} \leq x\right\} = \Phi(x).$ (D) $\lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\frac{2X_n - 2n}{\sqrt{n}} \leq x\right\} = \Phi(x).$

 答案
区域

 纠错
笔记

555 设 $X_1, X_2, \dots, X_n (n \geq 2)$ 为来自总体 $N(\mu, 1)$ 的简单随机样本, 记 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$, 则不能得出结论

(A) $\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2$ 服从 χ^2 分布.

(B) $2(X_n - X_1)^2$ 服从 χ^2 分布.

(C) $\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$ 服从 χ^2 分布.

(D) $n(\bar{X} - \mu)^2$ 服从 χ^2 分布.



556 设总体 X 服从正态分布 $N(0, \sigma^2)$, $\bar{X}, S^2$ 分别为容量是 n 的样本的均值和方差, 则可以作出服从自由度为 $n-1$ 的 t 分布的随机变量

(A) $\frac{\sqrt{n}\bar{X}}{S}$.

(B) $\frac{\sqrt{n}\bar{X}}{S^2}$.

(C) $\frac{n\bar{X}}{S}$.

(D) $\frac{n\bar{X}}{S^2}$.



557 设 $X_1, X_2, X_3, \dots, X_{11}$ 是来自正态总体 $N(0, \sigma^2)$ 的简单随机样本, $Y^2 = \frac{1}{10} \sum_{i=2}^{11} X_i^2$, 则

(A) $X_1^2 \sim \chi^2(1)$.

(B) $Y^2 \sim \chi^2(10)$.

(C) $\frac{X_1}{Y} \sim t(10)$.

(D) $\frac{X_1^2}{Y^2} \sim F(10, 1)$.



558 设总体 X 服从正态分布 $N(0, \sigma^2)$, $X_1, \dots, X_n$ 是取自总体 X 的简单随机样本, 其均值、方差分别为 $\bar{X}, S^2$. 则

(A) $\frac{\bar{X}^2}{S^2} \sim F(1, n-1)$.

(B) $\frac{(n-1)\bar{X}^2}{S^2} \sim F(1, n-1)$.

(C) $\frac{n\bar{X}^2}{S^2} \sim F(1, n-1)$.

(D) $\frac{(n+1)\bar{X}^2}{S^2} \sim F(1, n-1)$.



559 设 X_1, X_2, X_3, X_4 是来自总体 $X \sim N(0, \sigma^2)$ 的简单随机样本, 则统计量 $Y = \frac{(X_1 - X_2)^2 + (X_3 - X_4)^2}{(X_1 + X_2)^2 + (X_3 + X_4)^2}$ 服从

(A) $F(4, 4)$ 分布. (B) $F(2, 2)$ 分布. (C) $F(2, 4)$ 分布. (D) 不是 F 分布.



560 设总体 X 与 Y 都服从正态分布 $N(0, \sigma^2)$, 已知 $X_1, \dots, X_m$ 与 $Y_1, \dots, Y_n$ 是分别来自总体 X 与 Y 两个相互独立的简单随机样本, 统计量 $Y = \frac{2(X_1 + \dots + X_m)}{\sqrt{Y_1^2 + \dots + Y_n^2}}$ 服从 $t(n)$ 分布, 则 $\frac{m}{n}$ 等于

(A) 1.

(B) $\frac{1}{2}$.

(C) $\frac{1}{3}$.

(D) $\frac{1}{4}$.



微信公众号: 顶尖考研
(ID: djky66)

561 设 $X_1, X_2, \dots, X_n (n \geq 2)$ 为来自总体 $N(\mu, \sigma^2) (\sigma > 0)$ 的简单随机样本, 令 $\bar{X} =$

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i, S = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}, S^* = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}, \text{则}$$

(A) $\frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \mu)}{S} \sim t(n).$

(B) $\frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \mu)}{S} \sim t(n-1).$

(C) $\frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \mu)}{S^*} \sim t(n).$

(D) $\frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \mu)}{S^*} \sim t(n-1).$



562 设随机变量 $X \sim F(n, n), p_1 = P\{X \geq 1\}, p_2 = P\{X \leq 1\}$, 则

(A) $p_1 < p_2.$

(B) $p_1 = p_2.$

(C) $p_1 > p_2.$

(D) p_1, p_2 的值与 n 有关, 因而无法比较.



563 假设总体 X 服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2), X_1, \dots, X_n$ 是取自总体 X 的简单随机样本 ($n > 1$), 其均值为 $\bar{X}$, 如果 $P\{|X - \mu| < a\} = P\{|\bar{X} - \mu| < b\}$, 则比值 $\frac{a}{b}$

(A) 与 σ 及 n 都有关.

(B) 与 σ 及 n 都无关.

(C) 与 σ 无关, 与 n 有关.

(D) 与 σ 有关, 与 n 无关.



564 已知总体 X 的期望 $EX = 0$, 方差 $DX = \sigma^2$, 从总体中抽取容量为 n 的简单随机样本, 其样本均值为 $\bar{X}$, 样本方差为 S^2 . 记统计量 $T_k = \frac{n}{k}\bar{X}^2 + \frac{1}{k}S^2 (k = 1, 2, 3, 4)$, 已知 $ET_k = \sigma^2$, 则 $k =$

- (A) 1. (B) 2. (C) 3. (D) 4.



565 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的简单随机样本, 则数学期望 $E\left\{\left(\sum_{i=1}^n X_i\right)\left[\sum_{j=1}^n (nX_j - \sum_{k=1}^n X_k)^2\right]\right\}$ 等于

- (A) $n^3(n-1)\mu \cdot \sigma^2$. (B) $n(n-1)\mu \cdot \sigma^2$.
(C) $n^2(n-1)\mu \cdot \sigma^2$. (D) $n^3(n-1)\mu \cdot \sigma$.



566 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 和 $Y_1, Y_2, \dots, Y_n$ 分别来自总体均为正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ 的两个相互独立的简单随机样本, 记它们样本方差分别为 S_X^2 和 S_Y^2 , 则统计量 $T = (n-1)(S_X^2 + S_Y^2)$ 的方差 DT 是

- (A) $2n\sigma^4$. (B) $2(n-1)\sigma^4$. (C) $4n\sigma^4$. (D) $4(n-1)\sigma^4$.



567 假设总体 X 服从参数为 λ 的泊松分布, $X_1, \dots, X_n$ 是取自总体 X 的简单随机样本, 其均值为 $\bar{X}$, 方差为 S^2 . 已知 $\hat{\lambda} = a\bar{X} + (2-3a)S^2$ 为 λ 的无偏估计, 则 a 等于

- (A) -1. (B) 0. (C) $\frac{1}{2}$. (D) 1.



568 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本, X 的分布律为

X	-1	0	1
P	θ	$1-2\theta$	θ

$0 < \theta < \frac{1}{2}$

则未知参数 θ 的矩估计量 $\hat{\theta}$ 为

- (A) $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$. (B) $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2$. (C) $\frac{1}{2n} \sum_{i=1}^n X_i$. (D) $\frac{1}{2n} \sum_{i=1}^n X_i^2$.



569 设总体的概率密度函数为 $f(x; \sigma) = \frac{1}{2\sigma} e^{-\frac{|x|}{\sigma}}$, $-\infty < x < +\infty$, 其中 $\sigma \in (0, +\infty)$

为未知参数, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本, 则 σ 的最大似然估计量 $\hat{\sigma} =$

- (A) $\bar{X}$. (B) $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |X_i|$. (C) S . (D) $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$.



本题有视频讲解哟, 答案册扫码。

570 假设总体 X 的方差 DX 存在, $X_1, \dots, X_n$ 是取自总体 X 的简单随机样本, 其均值和方差分别为 $\bar{X}, S^2$, 则 EX^2 的矩估计量是

- (A) $S^2 + \bar{X}^2$. (B) $(n-1)S^2 + \bar{X}^2$. (C) $nS^2 + \bar{X}^2$. (D) $\frac{n-1}{n}S^2 + \bar{X}^2$.

答题区域

纠错笔记

571 总体均值 μ 置信度为 95% 的置信区间为 $(\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2)$, 其含意是

- (A) 总体均值 μ 的真值以 95% 的概率落入区间 $(\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2)$.
 (B) 样本均值 $\bar{X}$ 以 95% 的概率落入区间 $(\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2)$.
 (C) 区间 $(\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2)$ 含总体均值 μ 的真值的概率为 95%.
 (D) 区间 $(\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2)$ 含样本均值 $\bar{X}$ 的概率为 95%.

答题区域

纠错笔记

572 设总体 X 服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, 其中 σ^2 已知, 记参数 μ 的置信区间长度 L , 则当置信度 $1-\alpha$ 减少时

- (A) L 减小. (B) L 增大. (C) L 不变. (D) L 增减不一定.

答题区域

纠错笔记

微信公众号: 顶尖考研
(ID: djky66)

573 设一批零件的长度服从正态分布 $N(\mu, 4)$, 其中 μ 未知. 现从中随机抽取 9 个零件, 测得样本均值 $\bar{x} = 10(\text{cm})$, 则 μ 的置信度为 0.90 的置信区间是

- (A) $\left(10 - \frac{1}{3}\mu_{0.05}, 10 + \frac{1}{3}\mu_{0.05}\right)$. (B) $\left(10 - \frac{1}{3}\mu_{0.1}, 10 + \frac{1}{3}\mu_{0.1}\right)$.
(C) $\left(10 - \frac{2}{3}\mu_{0.05}, 10 + \frac{2}{3}\mu_{0.05}\right)$. (D) $\left(10 - \frac{2}{3}\mu_{0.1}, 10 + \frac{2}{3}\mu_{0.1}\right)$.

答题区域

纠错笔记

574 设总体 X 服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本, 据此样本检验假设: $H_0: \mu = \mu_0, H_1: \mu \neq \mu_0$, 则

- (A) 如果在检验水平 $\alpha = 0.01$ 下拒绝 H_0 , 那么在检验水平 $\alpha = 0.05$ 下必拒绝 H_0 .
(B) 如果在检验水平 $\alpha = 0.01$ 下拒绝 H_0 , 那么在检验水平 $\alpha = 0.05$ 下必接受 H_0 .
(C) 如果在检验水平 $\alpha = 0.01$ 下接受 H_0 , 那么在检验水平 $\alpha = 0.05$ 下必拒绝 H_0 .
(D) 如果在检验水平 $\alpha = 0.01$ 下接受 H_0 , 那么在检验水平 $\alpha = 0.05$ 下必接受 H_0 .

答题区域

纠错笔记

575 在假设检验中, 如果待检验的原假设为 H_0 , 那么犯第二类错误是指

- (A) H_0 成立, 接受 H_0 . (B) H_0 不成立, 接受 H_0 .
(C) H_0 成立, 拒绝 H_0 . (D) H_0 不成立, 拒绝 H_0 .

答题区域

纠错笔记

基 础 过 关



微信公众号【顶尖考研】
(ID: djky66)

2 阶

高等数学

填空题

576 在级数

① $\left(1 - \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4}\right) + \cdots + \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}\right) + \cdots,$

② $1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \cdots + \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} + \cdots,$

③ $2 - \frac{3}{2} + \frac{3}{2} - \frac{4}{3} + \frac{4}{3} - \frac{5}{4} + \cdots + \frac{n+1}{n} - \frac{n+2}{n+1} + \cdots,$

④ $\left(2 - \frac{3}{2}\right) + \left(\frac{3}{2} - \frac{4}{3}\right) + \left(\frac{4}{3} - \frac{5}{4}\right) + \cdots + \left(\frac{n+1}{n} - \frac{n+2}{n+1}\right) + \cdots$

中, 发散级数的序号是_____.



答题
区域



纠错
笔记

微信公众号【顶尖考研】
(ID: djky66)

577

已知级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{n+1}}{n^{\alpha}}$ 收敛, 则 α 应满足_____.



答题
区域



纠错
笔记

578

设 $\{a_n\}$ 是递减的正数列, $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$ 发散, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n a_n}{a_{n+1}} x^n$ 的收敛区间是_____.



579

已知幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 在 $x=1$ 处条件收敛, 则幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n (x-1)^n$ 的收敛半径为_____.



微信公众号【顶尖考研】
(ID: djky66)

580

设 $a_n > 0 (n=1, 2, \dots)$, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散, $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} a_n$ 收敛, 则幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n 2^n x^{2n}$ 的收敛域为_____.



581

已知幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n \left(x - \frac{1}{2}\right)^n$ 在 $x = 2$ 处发散, 在 $x = -1$ 处收敛, 则幂级数

$\sum_{n=1}^{\infty} a_n (x-1)^n$ 的收敛域是_____.



582

幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n[4^n + (-3)^n]}$ 的收敛半径 $R =$ _____, 收敛域为_____.



微信公众号【顶尖考研】
(ID: djky66)

583

幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n} + \frac{1}{2^n}\right) x^n$ 的收敛域为_____, 和函数 $S(x) =$ _____.



584

幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{2n+1}{(2n)!} x^{2n}$ 的和函数 $S(x) = \underline{\hspace{2cm}}$ ($x \in \underline{\hspace{2cm}}$).



585

幂级数

$$1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{2 \cdot 4} - \frac{x^6}{2 \cdot 4 \cdot 6} + \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!!} + \cdots$$

的和函数 $S(x) = \underline{\hspace{2cm}}$.



微信公众号【顶尖考研】
(ID: djky66)

586

幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}$ 的和函数 $S(x) = \underline{\hspace{2cm}}$.



587 把函数 $f(x) = \frac{1}{x^2 - 2x - 3}$ 展开为 x 的幂级数, 则 $f(x) =$ _____.

 答题
区域

 纠错
笔记

588 $f(x) = \ln(2 + x - 3x^2)$ 在 $x = 0$ 处的泰勒展开式为 _____.

 答题
区域

 纠错
笔记

微信公众号【顶尖考研】
(ID: djky66)

589 设 $f(x) = x \arctan x - \ln \sqrt{1+x^2}$, 则 $f(x)$ 的幂级数展开式是 _____.

 答题
区域

 纠错
笔记

微信公众号: 顶尖考研
(ID: djky66)

590

设 $f(x)$ 是周期为 2 的周期函数且 $f(x) = \begin{cases} x, & 0 \leq x \leq 1 \\ 0, & 1 < x < 2 \end{cases}$, $f(x)$ 的傅里叶级数为 $\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos n\pi x + b_n \sin n\pi x)$, 则 $n \geq 1$ 时, $a_n =$ _____.



591


设 $a, b, c \neq 0$, 若 $a = b \times c, b = c \times a, c = a \times b$, 则 $|a| + |b| + |c| =$ _____.



微信公众号【顶尖考研】
(ID: djky66)

592

过点 $P(-1, 0, 4)$ 且与平面 $3x - 4y + z + 10 = 0$ 平行, 又与直线 $L: \frac{x+1}{1} = \frac{y-3}{1} = \frac{z}{2}$ 相交的直线方程是 _____.



593

直线 $L: \begin{cases} 2y + 3z - 5 = 0 \\ x - 2y - z + 7 = 0 \end{cases}$ 在平面 $\Pi: x - y + 3z + 8 = 0$ 上的投影方程为

 答题
区域

 纠错
笔记

594

直线 $L: \frac{x-3}{2} = \frac{y-1}{3} = z+1$ 绕直线 $L_1: \begin{cases} x=2 \\ y=3 \end{cases}$ 旋转一圈所产生的曲面方程是

 答题
区域

 纠错
笔记

微信公众号【顶尖考研】
(ID: djky66)

595

平面 $\Pi: x - 2y + 2z + 9 = 0$ 与以点 $M_0(2, 0, -1)$ 为球心的球面相切, 则该球面的方程是_____.

 答题
区域

 纠错
笔记

596

设 Ω 由 $x^2 + \frac{y^2}{2^2} + \frac{z^2}{3^2} \leq 1, 0 \leq z \leq 1$ 所确定, 则 $\iiint_{\Omega} z^2 dv =$ _____.



597

设 Ω 是由曲线 $\begin{cases} y^2 = 2z \\ x = 0 \end{cases}$ 绕 z 轴旋转一周而成的曲面与平面 $z = 2$ 和 $z = 8$ 所围立体, 则 $\iiint_{\Omega} (x^2 + y^2) dv =$ _____.



微信公众号【顶尖考研】
(ID: djky66)

598

设 Ω 是由曲面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 与 $z = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$ 所围成的区域, 则 $I = \iiint_{\Omega} (x + z) dv =$ _____.



599 设球体 $x^2 + y^2 + z^2 \leq z$ 上任一点处的密度等于该点到原点的距离的平方, 则此球的质心的 z 坐标为_____.

答案
区域

纠错
笔记

600 设 Σ 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 2ax (a > 0)$, 则面积分 $\iint_{\Sigma} (x^2 + y^2 + z^2) dS =$ _____.

答案
区域

纠错
笔记

微信公众号【顶尖考研】
(ID: djky66)

601 设 Σ 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$, 则 $\iint_{\Sigma} (x + y + z)^2 dS =$ _____.

答案
区域

纠错
笔记

微信公众号: 顶尖考研
(ID: djky66)

602

设曲线 C 为圆 $x^2 + y^2 = R^2$, 则线积分 $\oint_C (x^2 + y^2 + 2xy) ds =$ _____.



603

设 L 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 与平面 $x + y + z = 0$ 的交线, 则 $\oint_L (x + 2y)^2 ds =$ _____.



微信公众号【顶尖考研】
(ID: djky66)

604

已知曲线 L 为曲面 $z = \sqrt{2 - x^2 - y^2}$ 与 $x^2 + y^2 = 1$ 的交线, 则 $\oint_L x^2 y^2 z^2 ds =$ _____.



605

若曲线积分 $\int_L \frac{x dx - ay dy}{x^2 + y^2 - 1}$ 在区域 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 < 1\}$ 内与路径无关, 则 $a =$

 答题区域

 纠错笔记

606

设 C 为 $|x| + |y| = 1$, 取正向, 则 $\oint_C \frac{x dy - y dx}{|x| + |y|} =$ _____.

 答题区域

 纠错笔记

微信公众号【顶尖考研】
(ID: djky66)

607

设 C 为上半圆周 $y = \sqrt{2x - x^2}$ 从 $O(0, 0)$ 到 $A(2, 0)$ 的弧段, 则

$$\int_C (xe^{y^2} - 2y) dx + (x^2 - 1)ye^{y^2} dy = \underline{\hspace{2cm}}.$$

 答题区域

 纠错笔记

微信公众号: 顶尖考研
(ID: djky66)

608 设 C 为曲线 $y = \sqrt{\pi}x^2$ 上从 $O(0,0)$ 到 $A(1,\sqrt{\pi})$ 的曲线段, 则 $\int_C \cos y^2 dx - 2xy \sin y^2 dy =$ _____.



609 设 Γ 为曲线 $\begin{cases} x^2 + y^2 = 1 \\ x - y + z = 2 \end{cases}$, 从 z 轴正向往 z 轴负向看去为顺时针方向, 则

$$I = \oint_{\Gamma} (z - y)dx + (x - z)dy + (x - y)dz = \underline{\hspace{2cm}}.$$



微信公众号【顶尖考研】
(ID: djky66)

610 设 Ω 是由锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 与半球面 $z = \sqrt{R^2 - x^2 - y^2}$ 围成的空间区域, Σ 是 Ω

的整个边界的外侧, 则 $\oiint_{\Sigma} x dydz + y dzdx + z dx dy =$ _____.



611

设 Σ 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 在第一卦限部分的下侧, 则 $\iint_{\Sigma} xyz dx dy =$ _____.



612

设 D 是由 $x^2 + y^2 \leq a^2, y \geq 0$ 所确定的上半圆域, 则 D 的形心的 y 坐标 $\bar{y} =$ _____.



微信公众号【顶尖考研】
(ID: djky66)

613

设 Γ 为质量均匀分布的半圆 $y = \sqrt{1 - x^2}$, 线密度为 ρ , 则 Γ 对 x 轴的转动惯量 $I_x =$ _____.



微信公众号: 顶尖考研
(ID: djky66)

614 设 $f(x, y, z) = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$, 则 $\operatorname{div}(\operatorname{grad} f) \Big|_{(1, -2, 2)} =$ _____.



615 向量场 $\mathbf{A}(x, y, z) = (x + y + z)\mathbf{i} + xy\mathbf{j} + zk$ 的旋度 $\operatorname{rot} \mathbf{A} =$ _____.



微信公众号【顶尖考研】
(ID: djky66)

选 择 题

616 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 条件收敛, 则

- (A) 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n + |u_n|)$ 与级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n - |u_n|)$ 都收敛.
 (B) 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n + |u_n|)$ 与级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n - |u_n|)$ 都发散.
 (C) 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n + |u_n|)$ 收敛而级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n - |u_n|)$ 发散.
 (D) 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n + |u_n|)$ 发散而级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n - |u_n|)$ 收敛.



617 在关于级数的如下四个结论中正确的结论是

- (A) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n^2$ 都收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n + v_n)^2$ 收敛.
- (B) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n v_n|$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n^2$ 都收敛.
- (C) 若正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散, 则 $u_n \geq \frac{1}{n}$.
- (D) 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 且 $u_n \geq v_n (n = 1, 2, \dots)$, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 也收敛.

 答案
区域

 纠错
笔记

618 现有关于级数的如下四个结论:

- ① 若 $a_n > 0$ 且 $\frac{a_{n+1}}{a_n} < 1 (n = 1, 2, 3, \dots)$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛.
- ② 若 $a_n > 0$ 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} > 1$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散.
- ③ 若 $\sum_{n=1}^{\infty} (a_{2n-1} + a_{2n})$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛.
- ④ 设 $a_n > 0 (n = 1, 2, 3, \dots)$ 且极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} n a_n$ 存在, 又 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} n a_n = 0$.

其中正确的是

- (A) ①, ②. (B) ①, ③. (C) ③, ④. (D) ②, ④.

 答案
区域

 纠错
笔记

微信公众号: 顶尖考研
(ID: djky66)

619

设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 是正项级数, $S_n = \sum_{k=1}^n a_k$ 是它的部分和, 则下列结论中

① 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} S_n a_n$ 发散.

② 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{S_n}$ 收敛.

③ 若 $\{na_n\}$ 是有界数列, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 收敛.

④ 若 $a_n > a_{n+1} (n = 1, 2, 3, \dots)$ 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛.

正确的是

(A) ①, ②.

(B) ②, ③.

(C) ③, ④.

(D) ④, ①.



答案
区域



纠错
笔记

620

已知 $u_n > 0 (n = 1, 2, 3, \dots)$, 且 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} u_n$ 条件收敛. 若设 $v_n = 3u_{2n-1} - u_{2n} (n = 1, 2, 3, \dots)$, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$

(A) 发散.

(B) 条件收敛.

(C) 绝对收敛.

(D) 收敛或发散取决于 $\{u_n\}$ 的具体形式.



答案
区域



纠错
笔记

621

设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n, \sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 均发散, 则

(A) $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + b_n)$ 发散.

(B) $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ 发散.

(C) $\sum_{n=1}^{\infty} (|a_n| + |b_n|)$ 发散.

(D) $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n^2 + b_n^2)$ 发散.



答案
区域



纠错
笔记

622

在命题

① 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 收敛.② 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛且 $n \rightarrow \infty$ 时 a_n 与 b_n 是等价无穷小, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛.③ 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 则 $a_n = o\left(\frac{1}{n}\right) (n \rightarrow \infty)$.④ 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 又 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 绝对收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ 绝对收敛.

中正确的是

(A) ①.

(B) ②.

(C) ③.

(D) ④.

答案
区域纠错
笔记

623

设正项级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ 收敛, $b_n = (-1)^n \ln(1 + a_{2n})$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$

(A) 条件收敛.

(B) 绝对收敛.

(C) 发散.

(D) 不能确定是敛散性.

答案
区域纠错
笔记

624

设级数(1)是 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{n^{1+\frac{a}{n}}}$, $a > 0$ 为常数, 级数(2)是 $\sum_{n=1}^{\infty} \sin(\pi \sqrt{n^2+1})$, 则

(A) 级数(1)与级数(2)都是收敛的.

(B) 级数(1)与级数(2)都是发散的.

(C) 级数(1)发散, 级数(2)收敛.

(D) 级数(1)收敛, 级数(2)发散.

答案
区域纠错
笔记

微信公众号: 顶尖考研
(ID: djky66)

625

设 α, β, γ 均为大于 1 的常数, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^{\gamma} + \alpha^n}{n^{\alpha} + \ln^{\beta} n + \gamma^n}$

(A) 当 $\alpha > \gamma$ 时收敛.

(B) 当 $\alpha < \gamma$ 时收敛.

(C) 当 $\gamma > \beta$ 时收敛.

(D) 当 $\gamma < \beta$ 时收敛.



答案
区域



纠错
笔记

626

设有正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 满足

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln \frac{1}{a_n}}{\ln n} = q \neq 1$$

则下列条件中为该级数收敛的充要条件是

(A) $q > 1$.

(B) $q < 1$.

(C) $q \geq 2$.

(D) $q \leq \frac{1}{2}$.



答案
区域



纠错
笔记

627

在如下四个级数

① $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{\ln n}{n}$.

② $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(\sin n^2) \ln^3 n}{\sqrt[3]{n^4 + 1}}$.

③ $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{\sqrt{n} - (-1)^n}$.

④ $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} + \frac{(-1)^n}{n^2} \right)$.

中, 条件收敛的级数是

(A) ①, ②.

(B) ②, ③.

(C) ③, ④.

(D) ①, ④.



答案
区域



纠错
笔记

628 下列四个级数中,发散的级数是

(A) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(\ln n)^{\ln \ln n}}$.

(B) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^n}{\pi^n n!}$.

(C) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3 + (-2)^n}{3^n}$.

(D) $\sum_{n=2}^{\infty} \sin\left[\left(n + \frac{1}{\ln n}\right)\pi\right]$.



629 设 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln(n!)}{n^p}$ 收敛,则 p 的取值范围是

(A) $p > 1$.

(B) $p > 2$.

(C) $0 < p < 2$.

(D) $p > \frac{1}{2}$.



微信公众号【顶尖考研】

(ID: djky66)

630 设 $f(x)$ 有连续的一阶导数且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = a > 0$, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n f\left(\frac{1}{n}\right)$

(A) 发散.

(B) 绝对收敛.

(C) 条件收敛.

(D) 敛散性与 a 有关.



631 若 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛域是 $(-8, 8]$, 则 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{a_n x^n}{n(n-1)}$ 的收敛半径及 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{3n}$ 的收敛域分

别是

(A) $8, (-2, 2]$.

(B) $8, [-2, 2]$.

(C) $4, (-2, 2]$.

(D) $8, [-2, 2)$.



微信公众号:顶尖考研
(ID: djky66)

632

级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{n}{3^n}$ 的和 $S =$

(A) $\frac{3}{32}$.

(B) $\frac{3}{16}$.

(C) $\frac{3}{8}$.

(D) $\frac{3}{4}$.



答案
区域



纠错
笔记

633

幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n(n+1)}$ 的和函数 $S(x) =$

(A) $\ln(1-x) + \frac{1}{x} \ln(1-x) + 1 \quad (-1 \leq x < 1, x \neq 0)$.

(B) $\ln(1+x) + \frac{1}{x} \ln(1-x) + 1 \quad (-1 < x < 1, x \neq 0)$.

(C) $-\ln(1-x) + \frac{1}{x} \ln(1-x) + 1 \quad (-1 \leq x < 1, x \neq 0)$.

(D) $-\ln(1-x) + \frac{1}{x} \ln(1+x) + 1 \quad (-1 < x < 1, x \neq 0)$.



答案
区域



纠错
笔记

634

设 $f(x) = \begin{cases} \frac{1 - \cos x}{x^2}, & x \neq 0 \\ \frac{1}{2}, & x = 0 \end{cases}$, 则 $f(x)$ 在点 $x = 0$ 处六阶导数 $f^{(6)}(0)$

(A) 不存在.

(B) 等于 $-\frac{1}{6}$.

(C) 等于 $\frac{1}{56}$.

(D) 等于 $-\frac{1}{56}$.



答案
区域



纠错
笔记

635

设 $f(x) = \begin{cases} x+1, & 0 \leq x \leq \frac{1}{2} \\ x-1, & \frac{1}{2} < x < 1 \end{cases}$, $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin n\pi x (-\infty < x < +\infty)$, 其中 $b_n =$

$2 \int_0^1 f(x) \sin n\pi x dx$, 则 $S(-\frac{5}{2})$ 等于

(A) $\frac{1}{2}$.

(B) $-\frac{1}{2}$.

(C) $\frac{3}{2}$.

(D) $-\frac{3}{2}$.



636

曲线 $L: \begin{cases} \frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{4} - \frac{z^2}{5} = 1 \\ x - 2z + 3 = 0 \end{cases}$ 在 xOy 面上的投影柱面方程是

(A) $x^2 + 20y^2 - 24x - 116 = 0$.

(B) $4y^2 + 4z^2 - 12z - 7 = 0$.

(C) $\begin{cases} x^2 + 20y^2 - 24x - 116 = 0, \\ z = 0. \end{cases}$

(D) $\begin{cases} 4y^2 + 4z^2 - 12z - 7 = 0, \\ x = 0. \end{cases}$



637

直线 $L: \frac{x-2}{2} = \frac{y-1}{1} = \frac{z-3}{1}$ 与平面 $\Pi: x - y + 2z + 4 = 0$ 的夹角为

(A) π .

(B) $\frac{\pi}{3}$.

(C) $\frac{\pi}{6}$.

(D) $\frac{\pi}{2}$.



微信公众号: 顶尖考研
(ID: djky66)

638

直线 L 为 $\begin{cases} x+3y+2z+1=0 \\ 2x-y-10z+3=0 \end{cases}$, 平面 Π 为 $4x-2y+z-2=0$, 则

(A) L 平行于 Π .

(B) L 在 Π 上.

(C) L 垂直于 Π .

(D) L 与 Π 斜交.



639

点 $M_1(0, 1, -1)$ 到直线 $L: \frac{x-1}{1} = \frac{y}{-2} = \frac{z+1}{1}$ 的距离 $d =$

(A) $\sqrt{2}$.

(B) $\frac{\sqrt{3}}{2}$.

(C) $\frac{\sqrt{2}}{2}$.

(D) $\sqrt{3}$.



微信公众号【顶尖考研】
(ID: djky66)


640

设 $\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} \neq 0$, 则直线 $L_3: \frac{x-a_3}{a_1-a_2} = \frac{y-b_3}{b_1-b_2} = \frac{z-c_3}{c_1-c_2}$ 与直线 $L_1: \frac{x-a_1}{a_2-a_3} =$

$\frac{y-b_1}{b_2-b_3} = \frac{z-c_1}{c_2-c_3}$ 是

(A) 相交于一点. (B) 重合.

(C) 平行但不重合. (D) 异面直线.



641 设有空间区域 $\Omega_1: x^2 + y^2 + z^2 \leq R^2, z \geq 0$; 及 $\Omega_2: x^2 + y^2 + z^2 \leq R^2, x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0$, 则

(A) $\iiint_{\Omega_1} x dv = 4 \iiint_{\Omega_2} x dv.$

(B) $\iiint_{\Omega_1} y dv = 4 \iiint_{\Omega_2} y dv.$

(C) $\iiint_{\Omega_1} z dv = 4 \iiint_{\Omega_2} z dv.$

(D) $\iiint_{\Omega_1} xyz dv = 4 \iiint_{\Omega_2} xyz dv.$

答案
区域

纠错
笔记

642 设 Ω 是由曲面 $z = x^2 + y^2, y = x, y = 0, z = 1$ 在第一卦限所围成的区域, $f(x, y, z)$ 在 Ω 上连续, 则 $\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dv$ 等于

(A) $\int_0^1 dy \int_y^{\sqrt{1-y^2}} dx \int_{x^2+y^2}^1 f(x, y, z) dz.$

(B) $\int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}} dx \int_y^{\sqrt{1-y^2}} dy \int_{x^2+y^2}^1 f(x, y, z) dz.$

(C) $\int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}} dy \int_y^{\sqrt{1-y^2}} dx \int_0^1 f(x, y, z) dz.$

(D) $\int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}} dy \int_y^{\sqrt{1-y^2}} dx \int_{x^2+y^2}^1 f(x, y, z) dz.$

答案
区域

纠错
笔记

643 设 $f(x)$ 有连续的导数, $f(0) = 0$, 区域 Ω 由柱面 $x^2 + y^2 = t^2 (t > 0)$ 和两平面 $z = 0, z = 1$ 所围成, 则 $\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{1}{t^4} \iiint_{\Omega} f(x^2 + y^2) dv$ 等于

(A) $\pi f'(0).$

(B) $\pi f(0).$

(C) $\frac{\pi}{2} f(0).$

(D) $\frac{\pi}{2} f'(0).$

答案
区域

纠错
笔记

微信公众号: 顶尖考研
(ID: djky66)

644 下列结论

$$\textcircled{1} \oint_{x^2+y^2=a^2} (x^2+y^2) ds = a^2 \oint_{x^2+y^2=a^2} ds = 2\pi a^3.$$

$$\textcircled{2} \iint_{x^2+y^2 \leq a^2} (x^2+y^2) d\sigma = a^2 \iint_{x^2+y^2 \leq a^2} d\sigma = \pi a^4.$$

$$\textcircled{3} \oint_{x^2+y^2+z^2=a^2} (x^2+y^2+z^2) dS = a^2 \oint_{x^2+y^2+z^2=a^2} dS = 4\pi a^4.$$

$$\textcircled{4} \iiint_{x^2+y^2+z^2 \leq a^2} (x^2+y^2+z^2) dv = a^2 \iiint_{x^2+y^2+z^2 \leq a^2} dv = \frac{4}{3}\pi a^5.$$

中正确的条数为

(A) 1 条.

(B) 2 条.

(C) 3 条.

(D) 4 条.



645 设 $C_k (k=1,2,3)$ 分别为曲线 $x^2+y^2=1, \frac{x^2}{2}+y^2=1, x^2+y^2=2$, 其方向为逆时

针方向, $I_k = \oint_{C_k} (3yx^2+y^3)dx + (3x+y)dy, (k=1,2,3)$. 则

(A) $I_1 < I_2 < I_3$.

(B) $I_1 < I_3 < I_2$.

(C) $I_3 < I_2 < I_1$.

(D) $I_2 < I_1 < I_3$.



646 设曲线 L 为椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, 其周长为 l , 则 $\oint_L (bx+ay)^2 ds$ 等于

(A) $(a+b)l$.

(B) $(a^2+b^2)l$.

(C) a^2b^2l .

(D) abl .



647 设 L 是以 $A(1,0), B(0,1), C(-1,0), D(0,-1)$ 为顶点的正方形边界, 则

$$\oint_L \frac{x+y+1}{|x|+|y|} ds \text{ 等于}$$

- (A) $4\sqrt{2}$. (B) 0. (C) $2\sqrt{2}$. (D) 4.



648 在力场 $\mathbf{F} = \frac{y^3 \mathbf{i} - x^3 \mathbf{j}}{\sqrt{x^2 + y^2}}$ 的作用下, 一质点沿圆周 $x^2 + y^2 = 1$ 逆时针运动一圈所做的

功为

- (A) $\frac{\pi}{2}$. (B) $\frac{3\pi}{2}$. (C) $-\frac{\pi}{2}$. (D) $-\frac{3\pi}{2}$.



649 设 L 是圆周 $x^2 + y^2 = 1$, $\mathbf{n}$ 为 L 的外法线向量, $u(x, y) = \frac{1}{12}(x^4 + y^4)$, 则 $\oint_L \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} ds$ 等于

- (A) 0. (B) $\frac{\pi}{2}$. (C) π . (D) $-\pi$.



微信公众号: 顶尖考研
(ID: djky66)

650 设 Σ 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$, $\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma$ 为该球面外法线向量的方向余弦, 则 $\oiint_{\Sigma} (x^3 \cos \alpha + y^3 \cos \beta + z^3 \cos \gamma) dS$ 等于

- (A) $4\pi R^5$. (B) $2\pi R^3$. (C) $3\pi R^4$. (D) $\frac{12\pi R^5}{5}$.



651 下列曲线积分

- ① $\int_L \frac{x dy - y dx}{x^2 + y^2}$. ② $\int_L \frac{x dx + y dy}{x^2 + y^2}$. ③ $\int_L \frac{x dx + y dy}{\sqrt{x^2 + y^2}}$. ④ $\int_L \frac{x dy + y dx}{x^2 + y^2}$.

中, 在平面 $D: x^2 + y^2 > 0$ 上与路径无关的有

- (A) 1 个. (B) 2 个. (C) 3 个. (D) 4 个.



652 设曲线 $L: f(x, y) = 1$ ($f(x, y)$ 具有一阶连续偏导数), 过第 II 象限内的点 M 和第 IV 象限内的点 N , Γ 为 L 上从点 M 到点 N 的一段弧, 则下列积分小于零的是

- (A) $\int_{\Gamma} f(x, y) dx$. (B) $\int_{\Gamma} f(x, y) dy$.
(C) $\int_{\Gamma} f(x, y) ds$. (D) $\int_{\Gamma} f'_x(x, y) dx + f'_y(x, y) dy$.



653 设 Σ 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ 上半部分的上侧, 则下列结论不正确的是

- (A) $\iint_{\Sigma} x^2 dydz = 0$. (B) $\iint_{\Sigma} x dydz = 0$. (C) $\iint_{\Sigma} y^2 dydz = 0$. (D) $\iint_{\Sigma} y dydz = 0$.

答题
区域

纠错
笔记

654 设有曲线 $\Gamma: \begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = a^2 \\ x + y + z = 0 \end{cases}$, 从 x 轴正向看去为逆时针方向, 则

$\oint_{\Gamma} y dx + z dy + x dz$ 等于

- (A) $\sqrt{2}\pi a^2$. (B) $-\sqrt{2}\pi a^2$. (C) $-\sqrt{3}\pi a^2$. (D) $\sqrt{3}\pi a^2$.

答题
区域

纠错
笔记

655 函数 $f(x, y, z) = x^2 y^3 + 3y^2 z^3$ 在点 $(0, 1, 1)$ 处方向导数的最大值为

- (A) $\sqrt{107}$. (B) $\sqrt{117}$. (C) 117. (D) 107.

答题
区域

纠错
笔记

656 函数 $f(x, y) = \arctan \frac{y}{x}$ 在点 $(1, 0)$ 处的梯度向量为

- (A) $-i$. (B) i . (C) $-j$. (D) j .

答题
区域

纠错
笔记

微信公众号: 顶尖考研
(ID: djky66)

顶尖考研: 公众号: 顶尖考研
(ID: djky66)

657 设可微函数 $f(x, y, z)$ 在点 (x_0, y_0, z_0) 处的梯度向量为 $\mathbf{g}$, $\mathbf{l} = (0, 2, 2)$ 为一常向量, 且 $\mathbf{g} \cdot \mathbf{l} = 1$, 则函数 $f(x, y, z)$ 在点 (x_0, y_0, z_0) 处沿 $\mathbf{l}$ 方向的方向导数等于

- (A) $2\sqrt{2}$. (B) $\frac{1}{2\sqrt{2}}$. (C) $-2\sqrt{2}$. (D) $-\frac{1}{2\sqrt{2}}$.



658 过点 $(1, 0, 0)$, $(0, 1, 0)$, 且与曲面 $z = x^2 + y^2$ 相切的平面为

- (A) $z = 0$ 与 $x + y - z = 1$. (B) $z = 0$ 与 $2x + 2y - z = 2$.
(C) $x = y$ 与 $x + y - z = 1$. (D) $x = y$ 与 $2x + 2y - z = 2$.



659 曲线 $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 2 \\ x + y + z = 0 \end{cases}$ 在点 $(1, -1, 0)$ 处的切线方程为

- (A) $\frac{x-1}{2} = y+1 = z$. (B) $\frac{x-1}{2} = \frac{y+1}{2} = \frac{z}{3}$.
(C) $\frac{x-1}{-1} = \frac{y+1}{-1} = \frac{z}{1}$. (D) $x-1 = y+1 = -\frac{z}{2}$.



660 函数 $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$ 在点 $(1, -1, 1)$ 处沿曲线 $x = t, y = -t^2, z = t^3$ 在该点指向 x 轴负向一侧的切线方向的方向导数等于

- (A) -12 . (B) 12 . (C) $-\frac{12}{\sqrt{14}}$. (D) $\frac{12}{\sqrt{14}}$.



金榜题名

考研当年5~11月 (强化提高)



《强化通关330题》
《历年真题全精解析·强化篇》



《决胜冲刺6套卷》
《临阵磨枪》

考研当年11~12月



《高数辅导讲义》
《线代辅导讲义》
《概率论辅导讲义》

考研当年7~11月 (专项强化)



《复习全书·综合复习篇》

考研当年2~7月 (全面复习)

无基础 不数学

考研前一年6月~12月



《复习全书·基础篇》

考研前一年9月~考研当年4月



《660题》

考研前一年10月~12月



历年真题
基础篇

书名	出版时间	适用阶段
数学公式的奥秘	2020年3月	全程复习
数学复习全书·基础篇	2020年6月	夯实基础
数学基础过关660题	2020年8月	夯实基础
数学历年真题全精解析·基础篇	2020年8月	夯实基础
数学复习全书	2020年12月	全程复习
数学历年真题全精解析	2021年1月	全程复习
高等数学辅导讲义	2021年3月	强化提高
线性代数辅导讲义	2021年3月	强化提高
概率论与数理统计辅导讲义	2021年3月	强化提高
数学强化通关330题	2021年4月	强化提高
数学决胜冲刺6套卷	2021年10月	冲刺预测
数学临阵磨枪	2021年10月	冲刺预测

G20210002



图书售后答疑群
你问我答 全程服务



作者团队微博
定期在线答疑



微信扫一扫
解锁更多精彩内容

